




خوست طب پوهنځي



Khost Medical Faculty

AFGHANIC



Prof. Dr. Baray Seddiqi

Assistant: Dr. Samiullah Safi



عمومي امبريولوژي

General Embryology

# General Embryology

## عمومي امبريولوژي

پوهاند ډاکټر بری صدیقی

همکار: پوهنځي ډاکټر سمیع الله صافی



سې ډي سره

پوهاند ډاکټر بری صدیقی



with CD

Funded by:

DAAD

Deutscher Akademischer Austausch Dienst  
German Academic Exchange Service

ISBN 978-9936-200-12-8



9 789936 200128 >

۱۳۹۱

2012

# عمومي امبریولوژی

پوهاند ډاکټر بری صدیقی

AFGHANIC



In Pashto PDF  
2012



Khost Medical Faculty

خوست طب پوهنځی


Funded by:  
**DAAD** Deutscher Akademischer Austausch Dienst  
German Academic Exchange Service

## General Embryology

Prof. Dr. Baray Seddiqi

Download: [www.ecampus-afghanistan.org](http://www.ecampus-afghanistan.org)









خوست طب پوهنځی

# عمومي امبریولوژی

پوهاند ډاکټر بری صدیقی

همکار: پوهنځیار ډاکټر سمیع الله صافی

۱۳۹۱

عمومي امريولوژي	د کتاب نوم
پوهاند ډاکتر بری صدیقی	لیکوال
پوهنپار ډاکتر سمیع الله صافی	همکار
خوست طب پوهنځی	خپرنډوی
www.szu.edu.af	ویب پاڼه
سهرمطبعه، کابل، افغانستان	چاپ ځای
۱۰۰۰	چاپ شمېر
۱۳۹۱	د چاپ کال
www.ecampus-afghanistan.org	د کتاب ډاونلوډ

دا کتاب د آلمان د اکاډمیکو همکاريو د ټولني (DAAD) لخوا د آلمان فدرالسي خارجه وزارت له پانگي څخه تمويل شوی دی.

اداري او تخنيکي چارې يې په آلمان کې د افغانیک موسسې لخوا ترسره شوې دي.

د کتاب د محتوا او ليکنې مسؤليت د کتاب په ليکوال او اړوندی پوهنځی پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبيق کوونکي ټولني په دې اړه مسؤليت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له مور سره اړیکه ونیسئ:

ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زدکړو وزارت، کابل

دفتري: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمیل: textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان: ISBN: 9789936200128



## د لوړو زده کړو وزارت پیغام

د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو کې ډیر مهم رول لوبولی دی او د درسي نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پیژندل شویو ستندردونو، معیارونو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

د لوړو زده کړو د مؤسسو د ښاغلو استادانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې ډیر زیاربي ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تألیف او ژباړلي دي. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم ترڅو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي خو تر چاپ وروسته د گرانو محصلینو په واک کې ورکړل شي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلینو د علمي سطحې د لوړولو لپاره معیاري او نوي درسي مواد برابر کړي.

په پای کې د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت، DAAD مؤسسې او ټولو هغو اړوندو ادارو او کسانو څخه مننه کوم چې د طبیی کتابونو د چاپ په برخه کې یې هر اړخیزه همکاري کړې ده.

هیله مند یم چی نوموړې پروسه دوام وکړي او د نورو برخو اړوند کتابونه هم چاپ شي.

په درنښت

پوهاند ډاکتر عبیدالله عبید

د لوړو زده کړو وزیر

کابل، ۱۳۹۱

## د درسي کتابونو چاپ او د طب پوهنځيو سره مرسته

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نوي معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه میتود تدریس کوی او له هغو کتابونو او چپترونو څخه کار اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

د دې ستونزو د هوارولو لپاره په تېرو دوو کلونو کې مونږ د طب پوهنځیو د درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل او تر اوسه مو ۶۰ طبي درسي کتابونه چاپ او د افغانستان ټولو طب پوهنځیو ته مو استولي دي.

دا کړنې په داسی حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

«د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمی نصاب د ریفورم لپاره له انگریزی ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي».

د افغانستان د طب پوهنځیو محصلین او استادان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نویو درسي موادو او معلوماتو ته نه لاس رسی، او له هغو کتابونو او چپترونو څخه کار اخیستل چې په بازار کې په ډېر ټیټ کیفیت پیدا کېږي د دې برخې له ځانگړو ستونزو څخه گڼل کېږي. له همدې کبله هغه کتابونه چې د استادانو له خوا لیکل شوي دي باید راټول او چاپ کړل شي. د هیواد د بېرني جنګ وهلي حالت په نظر کې نیولو سره مونږ لایقو ډاکترانو ته اړتیا لرو، ترڅو وکولای شي په هیواد کې د طبي زده کړو په ښه والي او پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. له همدې کبله باید طب پوهنځیو ته زیاته پاملرنه وشي.

تراوسه پوري مونږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ طب پوهنځيو او کابل طبي پوهنتون لپاره ۲۰ مختلف طبي تدریسي کتابونه چاپ کړي دي. د ۵۰ نورو طبي کتابونو د چاپ چارې روانې دي چې يوه بېلگه یی ستاسي په لاس کې همدا کتاب دی. د یادونې وړ ده چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هيواد ټولو طب پوهنځيو ته په وړيا توگه ویشل شوي دي.

د لوړو زده کړو د وزارت، پوهنتونو، استادانو او محصلينو د غوښتنې په اساس راتلونکي غواړو چې دا پروگرام غیر طبي برخو (ساینس، انجنیري، کرهنې) او نورو پوهنځيو ته هم پراخوالی ورکړو او د مختلفو پوهنتونو او پوهنځيو د اړتیا وړ کتابونه چاپ کړو.

خرنگه چې د درسي کتابونه چاپ زمونږ د پروگرام پروژه ده، د دې ترڅنگ زمونږ نورې کاري برخې په لنډ ډول په لاندې ډول دي:

#### **۱. د درسي طبي کتابونو چاپ**

کوم کتاب چې ستاسی په لاس کې دی زمونږ د فعالیتونو یوه بېلگه ده. مونږ غواړو چې دې پروسې ته دوام ورکړو ترڅو وکولای شو د درسي کتابونو په برابرولو سره د هيواد له پوهنتونو سره مرسته وکړو او د چیترا او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال ۱۰۰ عنوانه درسی کتابونه چاپ کړل شي.

#### **۲. په نوي میتود او پرمختللو وسایلو سره تدریس**

د ۲۰۱۰ کال په اوږدو کې پدې وتوانیدو چې د بلخ، هرات، ننگرهار، خوست او کندهار د طب پوهنځيو په ټولو ټولگيو کې پروجیکتورونه نصب کړو. د مناسب درسي چاپېریال د رامنځ ته کولو لپاره باید هڅه وشي چې ټول درسي، د کنفرانس اطاقونه او لابراتوارونه په مولتي میډیا، پروجیکتور او د لیدلو او اورېدلو په نورو وسایلو سمبال شي.

#### **۳. د اړتیاو ارزونه**

د طب پوهنځيو او سنی حالت (شته ستونزې او راتلونکي ننگونې) باید و ارزول شي او د هغه په اساس په منظمه توگه اداري، اکاډمیکې او پرمختیایي پروژې په لاره واچول شي.

#### ۴. مسلکي کتابتونونه

بايد د ټولو مهمو او مسلکي مضامينو کتابونه په نړيوالو معيارونو سره په انگريزي ژبه واخيستل شي او د طب پوهنځيو د کتابتونو په واک کې ورکړل شي.

#### ۵. لابراتوارونه

د هيواد په طب پوهنځيو کې بايد په بيلا بېلو برخو کې فعال لابراتوارونه موجود وي.

#### ۶. کدرې روغتونونه

د هيواد هره طب پوهنځۍ بايد کدرې روغتون ولري او يا هم په يوه بل روغتون کې د طب د محصلينو د عملي تريننگ لپاره شرايط برابر شي.

#### ۷. ستراتيژيک پلان

دا به ډېره گټوره وي چې د طب هره پوهنځۍ د اړونده پوهنتون د ستراتيژيک پلان په چوکاټ کې خپل ستراتيژيک پلان ولري.

له ټولو محترم استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي. زموږ په واک کې راکړي، چې په ښه کیفیت چاپ او وروسته يې د اړوندې پوهنځۍ، استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د يادو شويو ټکو په اړوند خپل وړانديزونه او نظريات زموږ په پته له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغېزمن گامونه پورته کړو.

له گرانو محصلينو څخه هم هيله کوو چې په يادو چارو کې له مونږ او ښاغلو استادانو

سره مرسته وکړي.

د آلمان د بهرنيو چارو له وزارت او DAAD (د آلمان اکاډميکو همکاريو ټولني) څخه مننه کوم چې تراوسه پورې يې د ۹۰ عنوانه طبي کتابونو مالي لگښت په غاړه اخيستی چې د هغو له ډلې څخه د ۵۰ عنوانو کتابونو د چاپ چارې روانې دي. د آلمان د ماینز پوهنتون (Mainz/Germany) د طب پوهنځۍ، د نوموړي پوهنځۍ استاد ډاکتر زلمی توريال، د افغانیک له موسسې او Dieter Hampel څخه هم مننه کوم چې د کتابونو په اداري او تخنيکي چارو کې يې له مونږ سره مرسته کړې ده.



په ځانگړي توگه د د جی آی زیت (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration and Development) یا د نړیوالی پناه غوښتنی او پرمختیا مرکز چې زما لپاره یې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړی دي هم مننه کوم.

د لوړو زده کړوله محترم وزیر بناغلي پوهاند ډاکتر عبید الله عبید ، علمی معین بناغلي پوهنوال محمد عثمان بابری ، مالي او اداري معین بناغلي پوهندوی ډاکتر گل حسن ولیزي ، د پوهنتونو او پوهنځیو له بناغلو رییسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ یې هڅولی او مرسته یې ورسره کړی ده.

همدارنگه د دفتر له بناغلو همکارانو ډاکتر محمد یوسف مبارک ، عبد المنیر رحمانزی ، احمد فهیم حبیبی ، سبحان الله او همت الله څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړی کیدونکی هلی ځلی کړی دي.

ډاکتر یحیی وردگ ، د لوړو زده کړو وزارت

کابل ، نومبر ۲۰۱۲ م

د دفتر ټیلیفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمیل: [textbooks@afghanic.org](mailto:textbooks@afghanic.org)

[wardak@afghanic.org](mailto:wardak@afghanic.org)

## سریزه

امبریولوژي د دوو یوناني کلمو یعنی Embryon د رشیم او logos د علم په معنی اخیستل شوې اما په یوه وسیع مفهوم د امبریولوژي علم د progenesis یعنی د جنسي حجراتو تشکیل او تکامل، embryonal period یا رشیمی دورې، Fetal period یا جنینی دورې او post natal period یا د ولادت نه وروسته دورې څخه بحث کوي.

انسانی امبریولوژي د دوو اساسي برخو څخه جوړه شوې، یو عمومي امبریولوژي چې د انسان د تکامل د عمومي قوانینو او مسایلو څخه بحث کوي بل خصوصي امبریولوژي چې د انسان د اعضاو او سیستمونو تکامل تر څپرني لاندې نیسي.

پدې کتاب کې د عمومي امبریولوژي مهم مسایل د طب د پوهنځي د درسي پروگرام سره سم راغونډ شوي، دا کتاب په (۱۴) فصلونو او (۱۵۴) مخونو کې د طب پوهنځي د درسي ساعتونو سره په مطابقت کې لیکل شوی، ددې مضمون زده کړه د طب د پوهنځي د نورو مسلکي مضامینو سره خصوصاً د ولادي د مضمون سره نژدې اړیکې لري او تقریباً د ولادي د مضمون ټول اساسات پدې کتاب کې ځای په ځای شوي چې علاوه د طب د پوهنځي د محصلینو څخه و هغو ډاکترانو ته چې په

ولادي مسايلو کې د خپل تخصص د پاره کار کوي د يوه ښه ممد په شکل استفاده کيدای شي .

سربيره پردې په دغه کتاب کې د ډيرو واضحو انځورونو څخه چې اړونده موضوع په ښه توگه روښانه کوي گټه اخستل شوي.

په آخر کې د خپلو همکارانو څخه چې ما سره يې ددې کتاب په چمتو کولو او د افغانيک مؤسيسې له منسوبينو څخه چې د دې کتاب په چاپ کې د زړه له کومې زيار وکښ مننه کوم، او د لاسياتې کاميابې او سرلورې لپاره ورته د لوي څښتن و دربار ته د عجز لاسونه لپه کوم.

څرنگه چې ددې کتاب ليکنه څه نا څه په بيره تر سره شوې ده، ممکن تخنيکي تيروتنې او نيمگړتياوې تر سترگو شي، نو د گرانو لوستونکو څخه په خورا درنښت هيله کيږي چې د دې کتاب د لوستلو پر مهال که د متن، مفهوم او معنی په لحاظ کومو غلطيو او تيروتنو سره مخ کيږي نو د ډيپارټمنټ د اډرس په نوم او يا په دغه ([drsami\\_safi@yahoo.com](mailto:drsami_safi@yahoo.com)) بريښنالیک سره مونږ ته خبر راگړي، تر څو د دې کتاب په وروستني چاپ کې سمون او تصحيح صورت ونيسي.

و من الله توفيق

پوهاند دوکتور بری «صديقي»

# لړلیک

مخ	موضوع
۱	<b>لومړۍ فصل</b> عمومیات او پیژندنه

- ۱ ..... د امبریولوژی تعریف
- ۱ ..... Ontogenesis یا انفرادی تکامل.....
- ۱ ..... Phylogenesis یا ګروپی تکامل.....
- ۲ ..... عمومي امبریولوژی.....
- ۳ ..... خصوصي امبریولوژی.....
- ۴ ..... تکثیر.....
- ۴ ..... غیر جنسي تکثیر.....
- ۴ ..... جنسي تکثیر.....

٦	.....تناسلي سيستم.
٦	.....نارينه تناسلي سيستم.
٧	.....خصيه.
١٢	.....The male Genetal Ducts
١٢	.....The auxillary Genetal Glands
١٣	.....قضيبي يا Penis
١٥	.....بنسٽينه تناسلي سيستم.
١٥	د تناسلي سيستم داخلي برخه
١٧	.....Ovary يا مبيض
٢٣	.....Fallopian tube يا نفير
٢٣	.....Uterus يا رحم
٢٦	.....Vagina يا مهبل
٢٦	د تناسلي سيستم خارجي برخه
٢٦	.....Clitoris
٢٧	.....Labia minor
٢٧	.....Labia major
٢٧	.....Vestibule

## دوهم فصل

۳۰

### ګامېټونه

۳۱ ..... سپرم يا د نارينه ګامېټ او د هغه اجزأ

۳۲ ..... د سپرم سر

۳۳ ..... د سپرم غاړه يا عنق

۳۳ ..... د سپرم لکۍ يا ذنب

۳۴ ..... د سپرماتوزوا وظيفه

۳۵ ..... Semen يا Seminal Fluid (منوي مايع)

۳۶ ..... اووم يا بنسټينه ګامېټ او د هغې اجزأ

## درېيم فصل

### Gametogenesis

۴۰ ..... Spermatogenesis

۴۰ ..... Spermatogonial Phase

۴۱ ..... Spermatocyte Phase

۴۵ ..... Spermatide Phase يا Spermeiogenesis

۴۷ ..... د مختلفو موادو تائير پر Spermatogenesis باندې.....

۴۸ .....Oogenesis

۵۱ ..... د Spermatogenesis او Oogenesis تر منځ توپرونه.....

## څلورم فصل

۵۴

د مؤنث جنس په تناسلي سيستم کې سيڪليڪ تغيرات

۵۵ .....Ovarian Cycle- I

۵۵ .....Pre- Ovulatory Phase

۵۵ .....Ovulatory Phase

۵۶ .....Post- Ovulatory Phase

۵۷ ..... د Corpus Luteum يا ژيپر جسم جوړيدل او تكامل.....

۵۷ .....Proliferation or Vasculisation Phase

۵۷ .....Glandular Metamorphosis

۵۷ .....Secretory Phase

٥٨	.....Involution or Regressive Phase
٥٩	.....Menstruation or Uterine Cycle – II
٥٩	.....Menstrual Phase
٥٩	.....Post Menstruation or Proliferation Phase
٦٠	.....Pre menstruation or Secretary Phase

## پینچم فصل

٦٢

### Development of the Human

٦٢	.....Prenatal period
٦٢	.....Pre- organogenesis
٦٣	..... Embryonic period
٦٤	..... Fetal period
٦٥	.....Postnatal period



## شپرم فصل

٦٨

### Fertilization يا القاح

٦٩

.....Capacitation

٦٩

.....Acrosome Reaction

٧٠

.....د القاح مراحل

٧٠

.....Penetration of corona radiate

٧٠

.....Penetration of the zona pellucid

٧١

.....Fusion of sperm & oocyte cell membrane

٧٤

.....Invitro Fertilization يا بهر القاح د عضويت نه

## اووم فصل

٧٤

### Cleavage يا انشقاق

٨٠

.....Abnormal zygots

## اتم فصل

۸۱

### Implantation & Bilaminar Germ Disk Formation

۸۸ ..... د implantation موقعیتونه

۸۹ ..... د implantation مخیونہ

۸۹ ..... مقدم سقط یا Early Abortion

## نهم فصل

۹۰

### Gastrulation & Tri Laminar Germ Disk Formation

## لسم فصل

۹۸

( د حمل د دریمې څخه تر اتمې هفتې پورې) Embryonic Period

۹۸ ..... د خارجي طبقې یا اکتودرم مشتقات

۹۸ ..... د متوسطې طبقې یا میزودرم مشتقات

۹۹ ..... د داخلي طبقې یا اندودرم مشتقات

## یولسم فصل

۱۰۰

Fetal Period (د حمل د دریمې میاشتې د شروع څخه تر تولد وخته پورې)

۱۰۵

..... د ولادت وخت

۱۰۵

..... د جنین غیر نورماله نشوونما

## دولسم فصل

۱۰۷

### Fetal Membrane and Placenta

۱۱۰

..... پلاستیا (Placenta)

۱۱۴

..... د پلاستیا د وینې دوران

۱۱۷

..... د پلاستیا وظایف

۱۱۷

..... د موادو تبادلہ

۱۱۹

..... د هورمونو تولید

۱۲۰

..... د میتابولیک موادو اطراح

۱۲۱

..... Umbilical Cord یا حبل سروي

۱۲۲

..... Amniotic Fluid یا امنیوتیک مایع

۱۲۵

..... Twins یا دوگانگی

۱۲۵

..... (Dizygotic Twins) ډای زایکوتیک دوگانگی

۱۲۶

..... (Monozygotic Twins) مونو زایکوتیک دوگانگی

۱۲۷

..... (Conjoints Twins) وصل شوې دوگانگی

## ديارلسم فصل

۱۲۹

Fetal Circulation (د جنين د ويني دوران)

## څلوارلسم فصل

۱۳۵

Congenital Malformation (ولادي سؤ تشكلات)

۱۳۶ ..... Infectuous Agents انتاني عوامل

۱۳۸ ..... Radiation يا شعاعي عوامل

۱۳۹ ..... Chemical Agents يا كيمياوي عوامل

۱۴۰ ..... Hormones هورمونونه

۱۴۰ ..... Nutritional Deficiency يا د غذايي موادو كمښت

۱۴۱ Chromosomal & Genital Factors كروموزومي او جنيتيكي عوامل

۱۴۱ ..... Numerical Abnormality رقمي انومالي

۱۴۵ ..... Structural Abnormality ساختماني انومالي

۱۴۶ ..... Genetic Anomalies جنيتيكي انومالي

۱۴۹ ..... ضميميوي جدولونه

## لمړی فصل

### عمومیات او پیژندنه

#### تعریف

امبریولوژي د دوو یوناني کلمو څخه یعنی Embryon د رشیم او Logos د علم په معنی، اخستل شویده. یعنی په یوه ساده مفهوم امبریولوژي هغه علم دی چه د رشیم او جنین د تکامل څخه بحث کوي اما په یوه وسیع مفهوم امبریولوژي علاوه د Embryonic Period (رشیمي دوره) او Fetal period (جنیني دوره) څخه د جنسي حجراتو شکل او تکامل او Postnatal period (د تولد وروسته دوره) هم په برکې نیسي.

- په حیواني عالم کې دوه نوع تکامل وجود لري: **Ontogenesis** یا انفرادي تکامل: عبارت د هغه تغیراتو او تحولاتو څخه دي چه په یوه حیوان کې د القاح څخه شروع او د ژوند تر آخره پورې دوام کوي.
- **Phylogenesis** یا ګروپی تکامل: هغه تغیرات او تحولات دي چه د حیواناتو په یوه ځانګړي ګروپ کې د زرونو او میلیونو کلونو په دوران کې لیدل کېږي.

انسانی امبریولوژی په دوه عمده برخو کې مطالعه کېږي:

## 1-عمومي امبریولوژی یا **General Embryology**: پدې


برخه کې د انسان د تکامل عمومي قوانین او مسایل خپرل کېږي (اکثراً لاندې مسایل پدې بخش کې تر مطالعې لاندې نیول کېږي)

- د جنسي حجراتو یا Gametes مطالعه.
- د جنسي حجراتو تکامل یا Gametogenesis
- د مؤنث تخمې آزادیدل یا Ovulation
- القاح یا Fertilization
- د زایکوټ ویش یا Cleavage
- غرس کېدل یا Implantation
- د دوه صفحوي رشیم تشکل یا Bilaminar Germ disk Formation
- د دری صفحوي رشیم تشکل یا Trilaminar Germ Disk Formation
- د رشيمي دورې یا Embryonic period عمومي او صاف.
- د جنيني دورې یا Fetal period عمومي او صاف.
- د جنين غشاوی او پلاستنتا یا Fetal Membranes & Placenta
- د جنين د وينې دوران یا Fetal Circulation
- ولادی سؤتشکلات یا Congenital Malformation

## 2- خصوصي امبریولوژي یا Special Embryology: دا

برخه د انسان د بدن د مختلفو غړو او سیستمونو د شکل او تکامل مطالعه په برکې نیسي چه ډیره پیچلی او اختصاصی مسأله ده.

پدې مبحث کې د عمومي امبریولوژي د مختلفو مسایلو په باب معلومات وړاندي کېږي. خو مخکې لدې چه د پورتنیو موضوعاتو په باب معلومات وړاندي کړو په اول کې باید د Reproduction یا تکثیر او Reproductive System تناسلي سیستم په اړه لنډ معلومات ولرو ترڅو د پورتنیو مطالبو په روښانه کولو کې د مشکل سره مخامخ نشو.





شکل (1-1) د مختلفو حیواناتو د تکامل پړاونه په مقایسوي توګه وینو.

## Reproduction یا تکثر

ژوندي موجودات د انقسام په نتیجه کې تکثر کوي، په حیواناتو کې معمولاً دوه ډوله تکثر لیدل کېږي، چه په لاندې توگه ورڅخه مختصراً یادونه کېږي:

### 1- Asexual Reproduction یا غیر جنسي تکثر: پدې

نوع تکثر کې نوی موجود د مور د عضویت د یوې برخې څخه د ساده (مستقیم انقسام) په نتیجه کې مثلاً په آمیب او یا د جوانه وهلو (Budding) په نتیجه کې مثلاً په هایډرا کې مینځ ته راځي. چې پدې ترتیب په دغه نوع تکثر کې نوی موجود د جسمي حجراتو څخه منشأ اخلي.



شکل (۱-۲): ښی اړخ، په هایډرا کې غیر جنسي تکثر - کین اړخ، په آمیب کې غیر جنسي تکثر راښایي.

### 2- Sexual Reproduction یا جنسي تکثر: په اکثر

کثیرالجروی حیواناتو کې د تکثر شروع د جنسي حجراتو څخه صورت نیسي چه دا ډول جنسي حجرات د والدینو په



مخصوصو اعضاؤو كې جوړيږي. او بيا د هغه د اتحاد په نتيجه كې نوى موجود منځته راځي. ددې د پاره چه جنسي حجرات يا Gametes نوې حيواناتو د جوړيدو قابليت پيدا كړى ضرورى ده چه يو تعداد تكاملي مراحل تير كړى، چه دا تكاملي مرحلې د نوى موجود د تكامل نه مخكې د Progenesis په نوم ياديږي.

يو نوع مخصوص جنسي تكثير د Parthenogenesis په نوم وجود لري چه پدې نوع تكثير كې تخمه پرته لدې چه د مذكر گاميت پواسطه القاح شي په نوى اورگانيزم باندي تكامل كوي دا نوع تكامل كېداى شي چه په طبعى صورت او يا د كېمياوي او ميخانيكي تنبه يا stimulation پواسطه صورت ونيسي.

د لومړي ځل د پاره په ۱۸۸۶ كال كې د پيله د چينجي تخمه د كېمياوي موادو پواسطه تنبيه او په مصنوعي ډول په هغه كې انقسام صورت وموند. دا نوع تكثير په ماهيانو، چنگښو او يو تعداد الوتونكو يا پرنده گانو كې لكه فيل مرغ، چينجيانو، د شهدو مچى او داسې نورو حيواناتو كې ليدل كېږي. يعنې پورتنى حيوانات كولاى شي چه يا د جنسي تكثير له ليارى او يا Parthenogenesis له لارې تكثير وكړي.


## Reproductive System یا تناسلي سیستم

د انسان د تناسلي سیستم مطالعه په دوه برخو کې صورت نیسي:

### Male Reproductive System - A یا مذکر تناسلي سیستم

The Male Genetal Ducts, د نارینه تناسلي د ستگاه د  
Penis او The Auxiliary Genital Glands ، Testis

شخه جوړه شویده:



شکل (۳-۱) : د نارینه د جنسي سیستم مختلفي برخي راښايي.

**I- TESTIS خصیه**

خصیه یا Testis یوه مختلطه غده ده چه اندوکراین او اګزوکراین دواړه افرازات لري اګزوکراین محصولات ئې عبارت د مذکر جنسي حجراتو یا Spermatozoids تولید او اندوکراین افراز یې عبارت د Testosterone هورمون څخه دی.

خصیه د یوې کڅوړې په شان ساختمان کې چې Scrotum نومیرې ځای لري تر Scrotum لاندې چه یو نازک جلد دی، د خصیې د کپسول درې طبقې لیدل کېږي:

a- Tunica Vaginalis: یوه نازکه طبقه ده چه میزوتیل حجراتو پواسطه پوښل شویده.


b- Tunica Albuginea: د متراکم منضم نسج یوه ضخیمه طبقه ده چه په هغه کې یو کم تعداد ملسأ حجرات هم وجود لري.

c- Tunica Vasculosa: دا طبقه د سست منضم نسج او شعریه عروقو د یوې شبکې څخه جوړه شویده.

د خصیې د کپسول تقلصات د سپرماتوزوئېد په خروج کې کمک کوي.

Tunica Albuginea د خصیې په خلف کې ضخیمیری او Mediastinum Testis یا منصف جوړوي.

چه د Mediastinum Testis څخه یو تعداد حجابات یا پردې منشأ اخلي او خصیه په ۲۵۰ اهرامي شکله Lobules (فصیصونو) باندې ویشي، چه رأس یې د Mediastinum خواته متوجه دی پدې حجاباتو کې یو تعداد سوري لیدل کیږي چه لوبولونو ترمنځ ارتباط برقراره ساتي. په هر لوبول کې ۱-۴ پورې منوي قناتونه یا Seminiferous-Tubules - شعریه عروق او Interstitial Cells of Leydig وجود لري.



شکل (۱-۴): خصیه او د هغې اطراحي لیاری رانمایی. د خصیې په داخل کې لوبولونه چې د پردو پواسطه سره بیل شوي، او په لوبولونو کې منوي نیوبولونه وینو، په خارج کې د خصیې پوښ (کیسول) او د هغه طبقات وینو، منصف هم تر سترگو کیږي. د خصیې اطراحي لیاری چې د هر لوبول له څوکي یا زروی څخه پیل کیږي لیدلای شو.

هر منوي قنات ۰.۲ mm قطر او د ۳۰-۷۰ cm پورې اوږدوالې لري چه د خپل ځان پر شاوخوا را پېچل شوی او د لوبول په رأس کې مستقیم شکل اختیار وي چه د Tubuli Recti په نامه یادېږي، اپیتل یې د Germinative Epithelium بنوم یادېږي چه پر یوه نازکه قاعدوی غشأ باندې قرار لري. پدې Germinative Epithelium کې دوه ډوله حجرات لیدل کېږي:


**1- Spermatogenic Cell:** د منوي قناتو په داخل کې د Spermatogenic Epithelium مختلف تکاملي مراحل لیدل کېږي، چه په ترتیب سره د قاعدی څخه وسطحي ته تفریق پذیری او د منوي قنات په مرکز کې په Spermatozoides باندې تبدیلیږي.

ددې سلسلی ابتدایي حجرات عبارت د Spermategonia څخه دی چه قاعدوی غشأ ته نژدې قرار لري او د هر سپرماتوګونیا په هسته کې Diploid کروموزومونه موجود دی. چه د هغه د جملې څخه ۴۴ جسمي یا سوماتیک کروموزومونه او دوه جنسي کروموزومونه (xy) دی.

دوه نوع سپرماتوګونیا وجود لري:

Spermategonia او Spermategonia Type A ، Type B ، د A تیپ سپرماتوګونیا د Mitosis د څو پرله پسې انقسامونه وروسته په ترتیب په A1، A2، A3،


Intermediate Spermatogonia او بالاخره په Spermatogonia Type B باندې تبدیلیږي. سپرماتوګونیا تیپ B د Growth نه وروسته په primary Spermatocyte چه د سپرماتوجنیک ایټل د ټولونه لویه حجره ده تبدیل او بیا د دوه پرله پسې Meiosis انقسامو په نتیجه کې ابتداً په دوه Secondary Spermatocyte وروسته په څلورو عددو Spermatides باندې تبدیلیږي چه هر سپرماتید د Meta- morphosis د عملیې پواسطه په Spermatozoid باندې تغیر شکل کوي.



شکل (۱-۵): په خصیه کې د منوي ټیوبونو د جدار یوه مقطع راښایي. د دغه جدار په ضخامت کې سپرم تولیدونکي حجرې چې په ترتیب سره له بهر څخه و داخل (جوف) ته د سپرماتوګونیا، سپرماتوسایټ ۱، سپرماتوسایټ ۲، سپرماتید په نوم یادېږي قرار لري، هیره دی نه وی چې د هغو قطارونو تر منځ چې د سپرم تولیدونکو حجرو پواسطه جوړېږي، یو ډول حجرات قرار لري چې د سرتولي حجراتو په نامه نومول کېږي، چې د سپرم تولیدونکو حجراتو ټوله اړتیا پوره کوي.

دا عملیه چه د هغه په نتیجه کې سپرماتوګونیا په سپرماتوزوئېد باندې بدلیری د Spermatogenesis په نوم یادیری چې د هغه په نتیجه کې د Diploid کروموزومونو درلودونکې حجرات په Haploid حجراتو باندې ویشل کیږي.

2- **Sertoli Cells**: ددې حجراتو تعداد په جرمیناتیف اپیتل کې کم او د سپرماتوجینیک حجراتو په منځ کې قرار لري. دا حجرات اوږده جگ حجرات دی چه پر قاعدوی غشا باندې قرار لري او حجرویی حدود یې غیر واضح دی. دا حجرات د سپرماتوجینیک حجراتو د تغذیې او استناد سبب ګرځي. همدارنګه دا حجرات سپرماتوجینیک حجرات د مضره موادو د اثر نه محافظه کوي.



د خصیې په لوبولونو کې د منوي قناتونو په فواصلو کې د خصیې بین الخلاکې نسج یا Interstitium قرار لري چه په هغه کې علاوه د کولاجن آلپافو، شعریه عروقو، فیروبلاست او مست سل خخه یو تعداد بین الخلاکې حجرات د Leydig Cells په نوم په ګروپی شکل و جود لري چه مذکر تناسلي هورمون یا Testosterone افرازوی چه دا هورمون د ثانوی تناسلي خواصو، جنسي تحریکاتو او د تناسلي قناتونو او ضمیموی غدواتو د فعالیت د کنترول سبب ګرځي.

## The Male Genital Ducts -II

- یو تعداد تیوب ماننده ساختمانونه دی چه د سپرم د مایع په اخراج کې کمک کوي چه په ترتیب سره عبارت دی له:
- ۱- Tubuli Recti ( نیغ یا مستقیم تیوبولونه )
  - ۲- Rate Testis ( د خصیې جال یا شبکه )
  - ۳- Ductus Efferentes (مرسله قناتونه)
  - ۴- Epididymus ( بړیخ )
  - ۵- Ductus Deferens ( ناقله قناتونه )
  - ۶- Ductus Ejaculatorous ( دافقه قناتونه )

## The Auxiliary Genital Glands -III

دا غدوات عبارت دی له:

- 1-Prostate Glands: چه یوه رقیقه شیدی ماننده مایع چه په هغه کې په کافی اندازه Acid phosphatase



وجود لري افراز وی. دا غده دا حلیل یا Urethra د ابتدایي قسمت په شاوخوا کې قرار لري.

## 2- Seminal Vesical: دا کپسه د Ductus Deferens

د امپولا یو اضافی قسمت دی چه د پروستات د غدی په خلف کې قرار لري او یوه ژیر رنگه مایع د Seminal Fluid په نوم افرازوی چه پدې مایع کې په کافی اندازه فرکتوز وجود لري او د سپرماتوزوئید د تغذیې سبب ګرځي.


## 3- Bubo Urethral Glands: د Cowper's Gland

په نوم هم یادیرې چه دوه عدده د یونخود په اندازه د غشائي احلیل په خلف کې قرار لري دا غدوات یوه روښانه چسپناکه ماده د mucous په نوم افرازوی.

## IV - Penis یا قضیب

دا ساختمان یوه مشترکه ګذر ګاه د ادرارو او منوي مایع د تیریدو د پاره ده، چه د دریو استوانه ئې شکله Erectile یا نغوذی ساختمانو څخه جوړ شوی چه دوه عدده ئې د Corpora Caverosa Penis په نوم او یو عدد ئې د Corpus Caverosum Urethra او یا Corpus Spongiosum پنوم د احلیل په شاوخوا کې قرار لري.

د Corpus Caverosum په منځ کې یو تعداد خالیگاوې موجودې دي چه د هغوی په فواصلو کې د منضم نسج یو تعداد حجابات وجود لري دا خالیگاوې د Erection (انتفاظ) په وخت کې د وینې څخه ډکېږي او د جنسي تحریک په ختم کې بیرته خپل اولني حالت ته راگرځي چه دې حالت ته Detumescence ویل کېږي.



شکل (۷-۱): د نارینه د تناسلي سیستم ټول غړي او د نوموړي سیستم ملحقه غدوات راښايي.


په شکل کې خصیه او د هغې اجزاي، اطراحيه ليارې، قضيب، پروستات، منوي کڅوړه تر سترگو کيږي.

## The Female Reproductive System –B

### ښځینه تناسلي سیستم


مؤنث تناسلي د ستگاه د دوه برخو څخه جوړه شویده:

**Internal Genitalia-** یا داخلي برخه: پدې برخه کې مبيض (Ovary)، نفیر (Uterine Tube یا Oviduct)، رحم (Uterus) او مهبل (Vagina) شامل دي.



**External Genitalia** یا خارجي برخه-: د فرج یا Vulva په نوم هم يادېږي چې له Clitoris، Vestibule، Labia Minora، او Labia Majora Glands، او Clitoridis څخه جوړ شوی دی.

د دې سیستم وظیفه چه د هورمونی او عصبي میکانیزمو پواسطه کنترولیری د مؤنث ګامیت یا Ovum له تولید، د جنین د تکامل لپاره د یوه مناسب محیط تهیه کول، د جنین د تکامل د پاره د مذکر ګامیت یا سپرما توزوئېد اخستل، د تکامل یافته جنین د تخلیې د پاره د یوه میکانیزم ایجاد او د ولادت څخه وروسته د Mammary Glands پواسطه د نوزاد تغذیه څخه عبارت ده. که څه هم Mammary Glands یو تناسلي عضوه نده خو د وظیفی له نظره پدې سیستم پورې اړه لري.



شکل (۱-۹): د ښځینه تناسلي سیستم خارجي برخه راښایي. پدې برخه کې Clitoris، Vestibule، Labia Minor، Labia Majora او Glands Clitoridis لیدل کیږي.

## Internal Genitalia یا د تناسلي سیستم داخلي برخه

### I - Ovary یا مبيض

یوه مختلطه غده ده چه اگزوکراین او اندوکراین افراز لري، اگزوکراین محصول ئې عبارت د Ovum د تولید څخه او اندوکراین افراز ئې Progesterone او Estrogen هورمونو افراز دی، یو بیضوی شکله ساختمان دی چې 4cm طول، 2cm عرض او 1cm ضخامت لري او د رحم دوو خواوته په pelvis Cavity کې پروت دی. د تخمدان یا مبيض خارجي سطح د یوې طبقې مکعبي حجراتو پواسطه د Germinal Epithelium په نوم پوښل شویده او نوموړې اپیتل لاندې د منظم نسج یوه متراکمه صفحه د Tunica Albuginea په نوم وجود لري د مبيض په مقطع کې دوی برخې لیدل کېږي.

1- **Medulla ovary**: د یوه متراکم منضم نسج نه جوړه شویده چه په هغه کې Blood & Lymphatic Vessels اعصاب او یو تعداد ملساً عضلات لیدل کېږي چې د مبيض د سری یا Hilus سره ارتباط لري.

2- **Cortex ovary**: دا برخه تر Tunica Albuginea لاندې قرار لري چه د Stroma او یو تعداد فولیکولو څخه جوړه شویده. ستروما د شبکوي الیافو او یو تعداد دوک ماننده حجراتو څخه چه هم د فیروبلاست او هم د ملساً حجراتو

خصوصيات لري جوړه شوي، همدارنگه د مبيض په قشر کې يو تعداد Follicles د تکامل په مختلفو مرحلو کې ليدل کېږي چه په لاندې ډول دي:

-a Primordial Follicles: ټولي تخمې د Primary Oocyte په مرحله کې د يوې طبقې هموارو فولیکولي حجراتو په واسطه پوښل شوي دي چه د primordial Follicles په نوم يادېږي. ددې فولیکولو تعداد د رحمی ژوند په اتمه مياشت کې اعظمي حد ته رسېږي چې شمير يې د ۷ ميليونو په شاوخوا کې primordial اپکل شوي دي. ددې فولیکولو تعداد په تدريج سره کم او د تولد په وخت کې د هغه تعداد د ۴۰۰-۷۰۰ زرو په شاوخوا کې وي ددې فولیکولو تعداد په تدريج سره نور هم کم او د بلوغ په وخت کې د هغه تعداد د مبيض په قشر کې ۱۰۰۰ عددو ته رابښکته کېږي چه لدې جملې څخه د ښځې په ټول تناسلي ژوند کې (Reproductive Life) يعنې د ۱۲-۱۱ کلنۍ څخه بيا تر ۴۵-۵۰ کلنۍ پورې د ۴۰۰-۵۰۰ عددو پورې فولیکولونه و خپل اعظمي تکامل ته رسېږي او تخمه تری آزاديږي پاتي نور فولیکولونه استحاله يا Degeneration کوي چه د Corpora Atretica په نوم يادېږي او په تدريج سره د مبيض په قشر کې له منځه ځي.

-b Primary Follicles: کله چه د primary Oocyte

شاوخوا همواری حجرې خپل شکل بدل او په مکعبی یا استوانه ئې حجراتو باندې تبدیلی شي او هم د هغوی په طبقاتو کې هم زیاتوالی راشي نو د Primary Follicle په نوم یادېږي دا Follicular Cells پر یوې نازکې قاعدوی غشا باندې استناد لري او ددې غشا پواسطه د مبيض د قشر د Stroma څخه جدا کېږي.

-c Secondary Follicles: پدې مرحل کې هم primary Oocyte

او هم فولیکولي حجرات تکامل کوي د تخمې جسامت زیات او د یوې ګلايکو پروټینې طبقې پواسطه چې Zona pellucida نومېږي احاطه کېږي. پدې مرحله کې د فولیکولو حجراتو په منځ کې یو تعداد کوچنی خالیګاوي مینځ ته راځي چه په هغه کې Follicular Fluid تجمع کوي دا واړه جوښونه سره یو ځای کېږي او یو لوی جوف د Antrum په نوم جوړوی او تخمه د فولیکول یوه طرف ته قرار نیسي او د یوه برجسته ساختمان په شکل تظاهر کوي چه Cumulus Oophorus نومېږي، پدې وخت کې د تخمې د شاوخوا فولیکولي حجرات شعاعي شکل اختیار وي چه د Corona Radiata په نوم یادېږي. هغه فولیکولو حجرات چه د Antrum په شاوخوا کې قرار لري Zona Granulosa یا Membrana Granulosa جوړ وي.

d- Mature Follicle یا Graafian follicle: کله چه

فولیکول خپل اعظمي تکامل ته ورسیري د Graafian follicle په نوم یاد او د مبيض د سطحې څخه تبارز کوي، په انسانانو کې د یوه فولیکول تکامل تقریباً ۱۴-۱۵ ورځې په برکې نيسي او پر ۱۴ یا ۱۵ ورځ Ovulation یا د تخمې آزادیدل صورت نيسي.




Graafian follicle د ساختمان له نظره د یوه جوف او یو جدار څخه جوړ شوی دی چه د فولیکول جوف د Antrum په نوم یادیري او په هغه کې Follicular Fluid چه د فولیکولي حجراتو پواسطه تولیدیري قرار لري د Antrum په یوه برخه کې تخمه د Zona pellucida او فولیکولي حجراتو سره یو ځای د فولیکول د جدار سره وصله ده، د Graafian Follicle جدار د Theca Follicli په نوم یاد او د دوو طبقو څخه جوړه شوی چه د Zona Granulosa څخه د Basal Membrane پواسطه جدا شویده.

د Graafian Follicle د جدار داخلي طبقه د Theca interna یا Vascular Layer پنوم یادیري چه پدې طبقه کې د Interstitial Cells یا بین الخلائي حجراتو برسیره یو زیاد شمیر او عیې هم وجود لري.

د فولیکول د جدار خارجي طبقه د Theca Externa یا Fibrous Layer پنوم یادیري. چه د یوه متراکم منضم نسج څخه جوړه شوی ده، د Ovulation یا تبیض نه وروسته د




فولیکول جدار را ټول او یو مؤقت غدوی ساختمان د progesterone په نوم جوړوی چه د Corpus Luteum هورمون افرازوی کله چه ددې جسم وظیفه ختمه شي Corpus Luteum په یو سپین رنگه ساختمان باندي چې Corpus Albicans نومیري تبدیلیږی او په تدریج سره د مبيض د قشر د ستروما پواسطه جذب او له منځه ځي.



سکل(۱۰۰۱): د تخمدان د فولیکولونو ډولونه، د خام یا ابتدایي شکل څخه پیل او تر پاڅه تمکین پورې په منظمه بڼه تر سترگو کیږی.

**A: Primordial Follicle**: بیضه یواځی دهموارو حجراتو د یو طبیعی پواسطه احاطه شوی ده. **B: Growing follicle**: چی د پرایموردیال فولیکول یو انکشافی شکل دی اطرافي حجری خپل شکل ته د ارتفاع په زیاتوالي سره تغیر ورکوي. **C: Primary follicle**: په دغه ډول فولیکول کی برسیره پردی چه داخلي بیضه انکشاف کوي، اطرافي حجری هم خپله ارتفاع زیاتوي یعنی مکعبی یا استوانه ای شکل خائنه غوره کوي او همدارنگه د طبقاتو تعداد بی هم زیاتولی مومي. **D: Secondary follicle**: په دغه فولیکول کی برسیره پردی چه د اطرافي حجرو د طبقاتو کټنه زیاتوالی مومي، ښکاره او لوڅ تغیر چی دلته تر سترگو کیږی د یوی روښانه ناحیې (Zona Pellucida) او یو جوف (Antrum) مینځ ته راتگ دی. **E: Mature or Graafian follicle**: یو پوځ فولیکول د هغه د ټولو اجزاوو سره راښایی. د فولیکول جوف (Antrum) هم ښکاري چی په هغه کی Follicular Fluid چه د فولیکولی حجراتو پواسطه تولیدیږی قرار لري، د فولیکول په اطراف کی Theca interna & externa لیدل کیږی.



شکل (۱۱-۱) : د تخمدان په قشر کې د فولیکولونو مختلف ډولونه د نشوونما په بېلا بېلو پړاونو کې راښیږي.  
 چه د Primordial د ډول څخه پیل او تر Graafian فولیکول پورې د نشوونما مختلف پړاونه سرته رسوي.

## II - نفیر یا oviduct یا Uterine Tube (Fallopian tube)

دوه عدده تیوب ماننده ساختمانونه دی چه د تخمدان او رحم په منځ کې قرار لري، 12cm-15cm اوږدوآلې او 1cm په اندازه قطر لري. ددې تیوب د مخاطي طبقې د حجراتو د Cilia او د تیوب د جدار د عضلاتو د تقلص په مرسته القاح شوی تخمه و رحم ته دا خلیږی نفیر څلور برخې لري چه له Ampulla، Isthmus، Infundibulum او Mural intra څخه عبارت دي، د infundibulum د برخې د پنجه ماننده ساختمانو یا Fimbria پواسطه تخمه د ovulation یا تبيض په وخت کې را جلا او د نفیر تیوب ته رهنمائي کېږي. د نفیر تر ټولو وسیع برخه عبارت د امپول څخه ده چه اکثراً القاح په همدی ناحیه کې صورت نیسي او تقریباً د تیوب ۲/۳ برخه جوړوی.

## III - رحم یا Uterus

یوه نسبتاً متوسع او ضخیمه ناحیه ده چه د نفیر او Vagina په منځ کې قرار لري. ددې ساختمان طول 7cm، عرض یې 5cm او ضخامت یې 2-3cm پورې دی، د رحم پورتنی برخه عریضه ده او د Corpus Uteri په نوم او لاندې برخه یې استوانه ئې شکل لري چې د Cervix

Uteri په نوم یادیرې، هغه برخه چه د جسم او عنق په منځ کې قرار لري د Isthmus په نوم یادیرې.


رحم د ساختمان له نظره د خارج څخه داخل ته د لاندې طبقاتو څخه جوړ شوی دی:

**1-Perimetrium:** یوه مصلی طبقه ده چه د رحم و دوه خواو ته د Broad Ligament پواسطه امتداد لري اما د نیمې لاندې برخې په قدامي برخه کې چه د مثانی سره مجاورت لري دا مصلی ورقه نه لیدل کېږي.

**2-Myometrium:** د ملساً عضلاتو یوه ضخیمه طبقه ده چه تقریباً ۱۲-۱۵ ملی مترو پورې ضخامت لري او د عضلي الیافو په منځ کې ئې کافی اندازه منظم نسج او اوعیه قرار لري. دا عضلي حجرات د حاملگی په دوران کې Hypertrophy او Hyperplasia کوي.

**3-Endometrium:** د رحم داخلي یا مخاطي طبقه ده چه میومیتریوم سره نښتې ده او د یوه ساده استوانه ئې اپیتل پواسطه پوښل شوی، ددې اپیتل په داخلیدو سره و لاندني منظم نسج ته د اندومتریوم غدوات په وجود راځي چه د هغه په فاصله کې منظم نسج یا Stroma قرار لري چه په دی ستروما کې علاوه د منظم نسج څخه اوعیه او یوه تعداد لوکوسیتونه هم لیدل کېږي. اندومتریوم دوی طبقې لري:

**Functional Layer-a:** د ا طبقه د یوې متراکمی سطحی طبقې او یوې سستی یا اسفنجی طبقې څخه جوړ شوی ده دا وظیفوی یا Functional طبقه د Menstruation اولادت په وخت کې تخریب او د مهبل له لارې خارجیږي



شکل(۱-۱۲): د ښځینه سیستم د داخلي برخې بیلا بیلې برخې راښایي. چې له Vagina یا مهبل، Uterus یا رحم، Uterine tube یا نفیرونه او Ovary تخمدان څخه عبارت دي ښکاري. د رحم درې گوني طبقې (اندومتریوم، مایو متریوم او پیريمتریوم) هم تر سترگو کیږي.

**Basal Layer -b:** د اندومتریوم د غدواتو عمیقه برخه ده چه د Menstruation او ولادت په وخت کې د منځه نه

ځي او د همدې ناحيې څخه دوباره اندومتريوم په نشونما باندې شروع کوي.

د رحم د Cervix مخاطي طبقه د اندومتريوم په Cyclic تغيراتو کې ډير جزوی تغيرات ښکاره کوي.

## IV - مهبل يا Vagina

يو ليفي عضلي پوښ دی چه د مخاط پواسطه پوښل شوی دی او درحم Cervix د دهليز يا Vestibule سره وصلوي. د Vagina يا مهبل په ایتل کې غدوات نه لیدل کېږي او د Cervix د غدواتو د مخاطي افرازتو پواسطه مرطوب ساتل کېږي. Hymen د مهبل د مخاطي طبقې يو عرضاني تبارز دی چه د Vagina او Vestibulum په منځ کې قرار لري او دا مجرا په نسبي ډول بندوی.

## The External Genitalia

### يا د ښځينه تناسلي سيستم خارجي برخه

د لاندې ساختمانو څخه جوړ شوی او د فرج يا Vulva په نوم هم يادېږي.


**Clitoris - I:** د نارينه د تناسلي آلې يو ابتدائي او ناقصه شکل دی چه د دوه Corpus Caverosum څخه چه د يوه Stratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل

شویدی په وجود راغلی، دا برخه یو زیات تعداد حسې آخډې لري.

**Labia Minora -II**: د مخاطي طبقې التوات دي چې د Vestibule یا د هلیز جنبي د یوالونه جوړوي.


**Labia Majora -III**: جلدي التوات دي چه Labia Minora د بیرون له طرفه پوښوي.

**Vestibule – IV**: یوه نسبتاً وسیع ناحیه ده چه په هغه کې Vagina خلاصیږی. د Vesti bule په جدار کې نژدې و Clitoris ته یو تعداد غدوات وجود لري چه Minor Vestibular Glands او Major Vestibular Glands یا Bartholine Glands په نوم یادیرې. دا غدوات مخاطي افرازات لري چه Hymen ته نژدې تخلیه کېږي.



شکل (۱-۱۳): د نارینه سیستم ټولې برخې ښکاري.






شکل (۱-۱۴) : د ښځينه سيستم د داخلي برخې ټولې اجزاوې راښايي.  
 (د رحم طبقات او مختلفې برخې، تخمدان او د تخمدان ارتباطي وسايل، نفير او د هغه مختلفه برخې) ښکار

## دوهم فصل گامیتونه (Gametes)

گامیتونه د جنسي حجراتو څخه عبارت دي چه د هغه د يو ځای کېدو په نتیجه کې د القاح د عملې پواسطه نوی اورگانیزم یا Zygote په وجود راځي. ددې حجراتو پواسطه ارثي خواص د والدینو څخه نوې اورگانیزم ته انتقالیږي.



شکل (۱-۲) : د نارینه او ښځینه گامیتونو یو ځای کیدل، د زایکوت، منځ ته راتگ او پرمختگ رانښایی.

گامیتونه د جسمي یا Somatic حجراتو برخلاف د Haploid کروموزومو درلودونکې دی چه ددې هیلوئید کروموزومو د جملې څخه یو عدد جنسي یا chromosome Sex او متباقي جسمي یا Somatic Chromosome دی.


دوه ډوله جنسي حجرات يا گامیتونه وجود لري، مؤنث گامیت يا تخمه (Oocyte II) Ovum او مذکر گامیت يا Spermatozoid يا Spermatozoa دا گامیتونه د مور او پلار په مخصوصو اعضاؤ (Gonads) کې جوړېږي چه دا گوناد په مذکر جنس کې خصيه يا Testis او په مؤنث جنس کې تخمدان يا Ovary دی.

## Spermatozoa or Male Gamete

( سپرم يا د نارينه نطفه )

مذکر جنسي حجرات په خصيه کې جوړ او د دفع يا Ejaculation په وخت کې په Seminal Fluid کې آزادېږي. د سپرماتوزوا شکل په مختلفو حيواناتو کې متفاوت دی اما اکثراً د Flagellum په شکل ليدل کېږي. ددې حجراتو جسامت په انسانانو کې د ۷۰-۵۰ میکرون پورې رسېږي ددې حجراتو تعداد په هر Ejaculation کې د ۳۰۰-۲۰۰ ميليونو په شاوخوا کې خارجېږي. سپرماتوزوا د ساختمان له نظره د دريو برخو څخه جوړ شويدي.

**1- Head یا Caput:** د سپرماټوزوا دا برخه د سائیتوپلازم، هستې او Acrosome څخه جوړه شوی، چه د سائیتوپلازم په شاوخوا کې Cell Membrane لیدل کېږي د سر زیاته برخه هسته تشکېلوي نو ځکه سائیتوپلازم د یوې حلقې په شان د هستې شاوخوا کې وجود لري، د



سپرماټوزوا هسته بیضوی شکل او د

### Haploid

کروموزومو

درلودنکې ده چه د

۲۳ کروموزومو د

جملې څخه ۲۲ عدده

یې جسمي

کروموزومونه یا

Autosome او یو

عدد یې جنسي

کروموزوم د X یا Y

له ډوله څخه دی، د

هغې په قدامي برخه

کې یو غلاف یا پوښ

ماننده ساختمان چې

شکل (۲-۲) : د نارینه جنسي حجره (سپرم) او د هغې مختلفې برخې وینو.

په شکل کې د سپرم سر، غړی او لکې ښکاري. په سر کې اکروزوم، هسته، سائیتوپلازم او حجروي غشاء، د غړی اجزای او د لکې درې برخې تر سترگو کېږي.

اکروزوم نومیرې وجود لري، د سائیتوپلازم د گلجی جهاز

څخه جوړشوی او په هغه کې Hyaluronidase او یو تعداد د proteolytic انزایمونه وجود لري چه د تخمې د جدار په انحلال کې برخه اخلي.

**2- عنق یا Neck:** د حجرې نازکه برخه ده چه د سپرماټوزوا سر یا رأس د سپرماټوزوا د لکې یا ذنب سره وصلوی دا برخه هم د سر په شان ده، ۵ میکرون په شاوخوا کې طول لري د سپرماټوزوا په عنق کې Proximal Centriole قرار لري چه د هغه څخه د سپرماټوزوا محور یا Flagyllum منشأ اخلي.

**3- ذنب یا Tail یا Cauda:** دا برخه ۵۰ میکرونه طول لري او دريو برخو نه جوړه شوی.

**a- متوسطه قطعه یا Middle piece:** د دې برخې اساسی ساختمان مایټوکاندریا جوړوی چه د سپرماټوزوا د محور په شاوخوا کې د فتر په شکل وجود لري ددې برخې په اخري قسمت کې Distal Centriole وجود لري چه د سپرماټوزوا محور د هغه د مرکز څخه تیریری.

د سپرماټوزوا محور یا Flagyllum د هغه د سنټریولو پواسطه منځه راغلی کوم چې د ۹ سیتو میکروټیوبول څخه جوړ شوی دی. دا د میکروټیوبولونو میله د Axonema په نوم یادیری چه د حجرې د غشأ پواسطه د خارج نه پوښل شوی دی.

**-b** اساسی قطعه یا Principale piece:

د سپرماټوزوا تر ټولو اوږده برخه ده چه د ۴۵-۴۰ میکرونو پورې اوږدوالی لري، ددې برخې قطر په تدریج سره کم او د محور په شاوخوا کې مایتوکاندريا وجود نلري.

**-c** آخری قطعه یا End Piece: پدې برخه کې فلاجيل خپله غشا هم د لاسه ورکوي او صرف Axonema باقی پاتې کېږي.

**د سپرماټوزوا وظایف**

د سپرماټوزوا اساسی وظیفه د تخمې القاح کول دی چه سپرماټوزوا مختلفې برخې پدې کار کې مشخصی وظیفې سرته رسوی:

**1-** د سپرماټوزوا هسته چه د هیلوئېد کروموزومو درلودنکې ده و نوی نسل ته Genetic مواد انتقالوی.

**2-** Acrosome د سپرماټوزوا په داخلیدو کې و تخمې ته کمک کوي.

**3-** Proximal Centriole د Zygote تکامل او انفسام تأمینوی.

**4-** Flagellum د سپرماټوزوا د حرکت او رسیدلو سبب و تخمې ته ګرځي.

**5-** مایتوکاندريا د سپرماټوزوا د حرکت د پاره انرژي تولیدوي.

## Semin یا Seminal Fluid (منوي مايع)

يوه سپين رنگه مکدره مايع ده چه د تناسلي سيستم د ضميموی غدواتو او تناسلي قناتو پواسطه توليد او په هغه کې سپرماتوزوا په مغلق شکل قرار لري، ددې مايع مقدار په هر دفع يا Ejaculation کې ۵-۲ ملی لیټرو پورې رسیری چه په هر ملی لیټر يا هر يو سی سی کې د ۱۰۰ ميليونو په شاوخوا کې سپرماتوزوا وجود لري د Semin خارجيدل پدې ترتيب صورت نیسي چه: په شروع کې د جنسي تحریک په نتیجه کې Bulbo Urethral.g او Litter.g په افرازاتو شروع کوي او د Cavernosum Urethra داخلي سطح مرطوبوي بيا د Ejaculation په وخت کې پروستات په افرازاتو شروع او دهغه قلوۍ افرازات دا حليل Acidity کموي. د هغه نه وروسته سپرماتوزوا په ډیر شدت سره د Ductus Deferens او Epididymis څخه د هغه د جدار د عضلي تقلص پواسطه خارجيږي او بالاخره د هغه سره د Seminal Vesicle غليظ افرازات چه Fructose درلودونکي دي او د سپرماتوزوما د تغذیه سبب ګرځي اضافه کېږي. د سپرماتوزوا د حياتیت د پاره مناسب محیط هغه محیط ګڼل کېږي چي PH يې د ۷-۸ په شاوخوا کې او د تودوخی درجه يې ۳۷ سانتي ګیراد وي، همدارنگه د سپرماتوزوا د انتقال د پاره منوي مايع حتمی او ضروری ده. په انسانانو کې د سپرماتوزوئېد حرکت په يوه دقیقه کې و 3mm ته رسیری. د انسان سپرماتوزوا تر

۳-۴ ورځو پورې په مؤنث تناسلي قناتو کې ژوندي پاتې کېدای شي. خو د القاح قابلیت تر ۴۸ ساعتو پورې ساتلی شي خو د عضویت نه بیرون د ۲-۳ ساعتونو په جریان کې خپل فعالیت په منوي مایع کې د لاسه ورکوي.

## Female Gamet یا تخمه (Ovum)

د تخمې شکل په اکثر و حیواناتو کې کروی دی. د تخمې تعداد په مختلفو حیواناتو کې فرق لري خو په انسانانو کې په هره میاشت کې صرف یوه تخمه خپل تکاملي مراحل سرته رسوی او د Secondary Oocyte په مرحله کې د تبیض یا Ovulation په نتیجه کې آزادېږي. د تخمې جسامت هم په مختلفو حیواناتو کې فرق لري خو په انسانانو کې د هغه جسامت د ۱۳۰ میکرونو په شاوخوا کې دی. د ساختمان له نظره هره تخمه د سایتوپلازم یا Ooplasm، هستې او حجروي غشا نه جوړه شوی ده.

د تخمې هسته د هپلوئید کروموزومو درلودنکې ده، چه د تخمې په مرکزی حصه کې قرار لري. د هستې د ۲۳ کروموزومو د جملې څخه ۲۲ جسمي کروموزومونه یا Autosome او یو عدد ئې جنسي کروموزوم یا Hetrosome دی د تخمې جنسي کروموزوم د X له ډوله دی.



د تخمې په سایتوپلازم کې مختلف ارګانيل وجود لري خو د آزادو رایبوزومو او اندوپلازمیک رتيکولوم تعداد پکې فوق العاده زیات دی، د تخمې مایټوکاندريا زیات انکشاف ندی کړی همدارنگه ګلجی جهاز په ابتدا کې هستی ته نژدې قرار لري او بیا په تدریج سره د تخمې و محیطی برخې ته انتقالېری سنتریول په ابتدا کې وجود لري خو د تکامل په جریان کې له منځه ځي.


د سایتوپلازم اساسی برخه ژیرمواد یا Yolk انکلوزنونه تشکیلوي چه د انکلوزن کروی شکل لري او د هغه په ترکیب کې فوسفولپید، پروتین او قندی مواد شامل دی،

دا مواد د اندوپلازمیک رتيکولیم او ګلجی جهاز پواسطه په تخمه کې تولید او د تکامل په ابتدایي مرحلو کې د رشیم د تغذیې د پاره یوه مهمه منبع شمیرل کېږي.



د تخمې په شاوخوا کې د ګلایکو پروتین یا Glycose Amino Glycans یوه روښانه او شفافه ناحیه د Zona Pellucida په نوم وجود لري چه د تخمې او فولیکولي حجراتو د مشترک فعالیت په نتیجه کې منځ ته راځي.

د Zona pellucida په شاوخوا کې یو یا څو طبقې Follicular Cells وجود لري چه د تخمې په تغذی او دفاع کې مهم رول اجرا کوي ددې حجراتو تعداد د تخمې په

شاوخوا کې د ۳-۴ زرو پورې رسیری او د تخمې په شاوخوا کې شعاعي تاج یا Corona Radiata جوړوي.



شکل (۲-۳) : ښځینه جنسي حجره (اووم) او د هغې مختلفې برخې رانښايي. حجرې غشاء یا Oolema، سائتوپلازم یا Ooplasm او اجزا یې، او هسته تر سترگو کیږي. د اووم په اطراف کې یو تعداد حجرات چې فولیکولي حجرات نومېږي د تکامل په مختلفو پړاونو کې د محافظوي او ضمیموي حجرو په توګه داووم (د ښځینه جنس جنسي حجره) سره یو ځای لیدل کیږي، همدارنګه د ګلايګوز امینو ګلايګانز پواسطه تولید شوي ناحیه (Zona Pellucida) هم لیدل کیږي.



شکل (۲-۴) پورته انخورد د نر نطفه، بشکته انخورد مونث جنس نطفه رانبايي

## درېيم فصل (Gametogenesis)

د مذکر او مؤنث جنسي حجراتو تکامل ته Gametogenesis ويل کېږي.


### Spermatogenesis

يوه مغلقه تکاملي عمليه ده چه د هغې په نتيجه کې يو تعداد ابتدائي Diploid حجرات د Spermatogonia په نوم چه د Seminiferous Tubules د جرميناتيډ اپتيل په قاعدوی برخه کې قرار لري په يو تعداد متکاملو Haploid حجراتو باندې د Spermatozoa په نوم تبديل او د منوي تيويونو په جوف کې آزاديږي. دا عمليه د يوه بالغ انسان په خصيه کې د ۶۴-۷۲ ورځو په بر کې نيسي.

د Spermatogenesis په يوه مکمل دوره کې دا لاندې مراحل ليدل کېږي:

**1- Spermatogonial Phase:** پدې مرحله کې يو تعداد Mitosis انفسامونه او نمو شامله ده چه د هغه په نتيجه کې Spermatogonia په Primary Spermocyte باندې تبديليږي.

**Spermatocyte Phase -2**: پدې مرحله کې دوه پر له پسې Meiosis انقسامونه لیدل کېږي، چه د اول Meiosis په نتیجه کې دوه Secondary Spermatocyte او د دوهم Meiosis په نتیجه کې څلور عدده Spermatides د هیلوئېد کروموزومو درلودنکې په وجود راځي.



شکل(۳-۱): د نارینه د جنسي حجری د تکامل مختلف پړاونه راښايي.  
 پدې ترتیب چې د سپرماتوگونیا څخه چې یوه ډیپلوئید (۴۶ عدده کروموزومو درلودونکی) حجره ده د مایټوټیک ویش په نتیجه کې دوه ډیپلوئید حجرات (سپرماتوسایټ - ۱) منځ ته راځي، د دغو حجراتو څخه د لومړي مایوزس ویش په پایله کې دوه، دوه هیلوئید حجرات (سپرماتوسایټ - ۲) منځ ته راځي، په همدې ترتیب سره د هری سپرماتوسایټ ۲- حجری څخه د دوهم مایوزس ویش په نتیجه کې یو، یو سپرماتید (هیلوئید حجره) لاس ته راځي.  
 چې بیا هر سپرماتید د میټامورفوز مرحلې د طی کولو وروسته په سپرم بدلون مومي.

Meiosis هغه انقسام دی چه صرف په Male Gamet او Femal Gamet کې صورت نیسي او د هغه په نتیجه کې Diploid کروموزومونه په Haploid کروموزومونو باندې ویشل کېږي.

## د اول Meiosis مراحل

**Prophase -A**: یوه ډیره مغلقه او پیچېده مرحله ده او د Mitosis د پروفیز مرحلې سره فرق لري او په هغه کې پټخه صفحی لیدل کېږي.

**Leptoten:-a**: پدې صفحه کې کروموزومونه متراکم او د نازکو رشتو په شکل راځي.

**Zygotene-b** یا **Synaptene**: پدې صفحه کې مشابه یا Hynaptene کروموزومونه یو او بل ته نژدې او Bivalent جوړوی چه دا جوړه شوی کروموزومونو په منځ کې د Gen تبادلې صورت ونیسي.

**Pachytene-c**: پدې صفحه کې کروموزومونه لنډ او ضخیم او هر کروموزوم طولاً پر دو برخو ویشل کېږي یعنې Bivalent کروموزومونه په څلورو کروماتونو باندې د Tetrade په نوم ویشل کېږي.

**Diplotene-d**: پدې صفحه کې کروماتیدونه یو د بل څخه جدا او هومولوگ کروماتیدونه یو او بل ته نژدې او قطعات

تبادلہ کوي چه دی تبادلې ته Crossing Over ویل کېږي. د یادولو وړ ده چه کروماتیدونه د جدائې په وخت کې صرف دوی د Centromere په ناحیه کې سره وصل پاتي کېږي. Diakinesis-e: پدې صفحه کې کروماتیدونه د جوړو په شکل جلا کېدو ته آماده کېږي.


د پروفیز د مرحلې په آخر کې چه مجموعاً ۲۲ ورځي په برکې نیسي هسته او هستوی غشا ورکېږي او Tetrade د حجرې په استوائې منطقه کې قرار نیسي.

**Metaphase-B**: د Mitosis د میتافیز د مرحلې سره شباهت لري پدې تفاوت چه د حجرې د استوائې خط په دوو طرفو کې د کروماتید په عوض کروموزومونه قرار لري.

**Anaphase-C**: د Mitosis د انافیز سره شامت لري پدې تفاوت چه د Chromatide په عوض هومولوگ Chromosome یو د بل څخه جلا کېږي یعنې Diade چه د دوه هومولوگ کروموزومو څخه جوړ شوی او هر یو ئې دوه کروماتید لري د حجرې مخالفو قطبو ته حرکت کوي.

**Telophase-D**: د Mitosis د تیلوفیز سره شباهت لري یعنې هسته او هستوی غشا دوباره په وجود راځي او سایتوپلازم په مساوي توگه ویشل کېږي او د هغه په نتیجه کې د یوه Primary Spermatocyte څخه چه ۴۶ کروموزومونه

لري دوه عدده Secondary Spermatocyt چې هر يو ۲۳  
عدده کروموزومه لري په وجود راځي.




شکل (۲-۳): د لومړي مایوزس مختلف پړاونه راښايي

## د دوهم Meiosis مراحل

د انقسام د عادی Mitosis سره شباغت لري او د یوه لنډ Interphase په تعقیب صورت نیسي. د انترفیز د مرحلې خصوصیت ئې دادی چه په هغه کې د Synthesis مرحله وجود نلري یعنې DNA نه دوه چنده کېږي او حتی په ځینو حیواناتو کې کله چه د Meiosis او ل انقسام ختم شي پرته له دی چه هسته تشکل وکړي د Meiosis د دوهم انقسام و Metaphase مرحلې ته داخلېږی ددې انقسام د Anaphase په مرحله کې د Secondary Spermatocyte (دیاد) طولاً تجزیه او په موناډ باندې ویشل کېږي چه هر موناډ د حجری یوه قطب ته حرکت کوي. ددې انقسام په نتیجه کې کوم حجرات چه په وجود راځي د Spermatides په نوم یاد او د ۲۳ کروماتیدو درلودونکي



دی چه ژر تر ژره په کروموزوم باندې بدلیږي. (د یوه کروموزوم نیم طولانی برخې ته Chromatid ویل کیږي) په نتیجه کې ویلو شو چې د Spermatogenesis د Primary دوهمی مرحلې په نتیجه کې د یوه Spermatoocyte څخه څلور عدده Spermatoide په وجود راځي.



شکل (۳-۳): د دوهم مایوزس مختلف پړاونه راښايي

### 3- Spermatoide Phase یا Spermeiogenesis :


عبارت د Spermatoides د تغیر شکل یا Metamorphosis څخه دی چې په پایله هر سپرماتید په سپرماتوزوا باندې بدلیږي. چه لاس ته راغلی سپرماتوزوا و القاح ته آماده حجرات گڼل کیږي.

سپرماتید کوچنی مدور حجرات دی چه د Sertoli حجراتو زروه یا رأس ته نژدې قرار لري، دا حجرات د سرتولی د حجراتو په سایتوپلازم کې د ننه شوی او سرتولی حجرات د

سپرماتید په میتامورفوزس کې په سپرماتوزوا باندې مهم رول لوبوی.

د میتامورفوز مرحله د Acrosomal Granule په جوړیدو سره چه د گلجی جهاز څخه منځته راځي شروع کېږي ددې گرانول جسامت په تدریج سره زیات او بالاخره د یوه غلاف یا پوښ په شکل د هستی په قدامي برخه کې قرار نیسي. سنتروزوم چه د دوه سنتریولو څخه جوړ شوی و مقابل سمت ته حرکت کوي یعنی یو ئې د عنق په حصه کې د proximal Centriole په نوم او بل ئې د Distal Centriole په نوم د عنق او ذنب په سرحد کې قرار نیسي او د دوه سنتریولو په منځ کې Flagyllum په جوړیدو شروع کوي او مایتوکاندريا د یوه فبر ماننده ساختمان په شکل د Flagyllum په شاوخوا کې د دوه سنتریولو په منځ کې قرار نیسي. په دی وخت کې د سایتوپلازم زیاته برخه د منځه ځي او صرف یو لبر مقدار سایتوپلازم د یوه حلقې په شکل د هستی په شاوخوا کې او همدارنگه یو لبر مقدار د عنق او ذنب د متوسطې قطعې په شاوخوا کې پاتي کېږي. د سرتولی حجرات یو لبر مقدار مایع د منوي کانالو په جوف کې افزوی چه سپرماتوزوا په کې شناور کېږي.

د Spermatogenesis د تکامل مختلف حجرات د منوي کانالو د جوف په ټولو برخو کې لیدل کېدای شي.



شکل (۳-۴): په سپرماتید کې د میتامور فوز مختلف پړاونه را په گوته کوي چې په پایله کې سپرم منځ ته راځي. د سپرماتید په کلجې باندې، سنټریوزوم، مایټوکاندريا او هسته کې د تغیراتو د منځ ته راتلو وروسته دغه حجره په سپرم بدلون مومي او د میتامورفوزس مرحله بشپړیږي.

## د مختلفو موادو تاثیر پر Spermatogenesis باندې

سپرماتوجینیک اپیتل د مختلفو عواملو په مقابل کې فوق العاده حساس دی مثلاً مختلف مواد چه د هغه په جمله کې مختلف Toxic مواد، د غذایي موادو کمښت، مختلف تشعشعات لکه X-Ray او داسې نور د Spermatogenesis عملیه یا ضعیفه او یا د منځه وړي او د سپرماتوجینیک اپیتل د اتروفی سبب ګرځي. همدارنگه د


حرارت لوړه درجه (مثلاً په تبه کې لوړه د حرارت درجه) او د خصې پاتې کېدل په بطن کې (Cryptorchidism) هم د سپرماتوجينيز د عمليې د مختل کېدو سبب ګرځي خصوصاً سپرماتيد او سپرماتوزوا ددې عواملو په مقابل کې فوق العاده حساس دی حال دا چه د سرټولي حجرات د پورټنيو فکتورو تر اثر لاندې هايپرټروفی کوي.

## Oogenesis

يوه تکاملي عمليه ده چه د هغه په نتيجه کې يو ابتدائي Diploid حجره يا Oogonia چه د مبيض د قشر د فولیکول په داخل کې قرار لري په يوه متکامله هپلوئيډ حجره د Ovum په نوم چه القاح ته آماده ده تبديليږي. ابتدائي جنسي حجرات د Female Gonocytes په نوم د داخل رحمی ژوند په شپږمه هفته کې د زرده کېسې د اندودرم د حجراتو په منځ کې مشخصه او بيا په پنځمه مياشت د ابتدائي حجرات د ژيرې کېسې څخه د تکامل په حامل کې ګونادو ته مهاجرت کوي او Oogonia جوړ وي. Oogonia د Mitosis په نتيجه کې تکثر کوي او د نمو يا Growth نه وروسته په Primary Oocyte باندې بدليږي او د primordial Follicle په داخل کې قرار نيسي، دا حجرات د تولد نه مخکې خپل اول Meiosis انقسام شروع

کوي خو د انقسام د prophase په مرحله کې توقف، او د بلوغ د سن په رسیدو سره سم د Ovulation څخه لږ څه مخکې خپل انقسام تکمیلوی او د یوه Primary Oocyte څخه دوه نوی حجرې په وجود راځي چه یو ئې په کافی اندازه سائتوپلازم لري او د Secondary Oocyte په نوم او د بل چه د سائتوپلازم اندازه کمه ده Primary Polar Body په نوم یادیرې اما ددې دوو حجرو د کروموزومو تعداد مساوي دی.

خو کله چه تبیض یا Ovulation صورت ونیسي، او Secondary Oocyte د فولیکول څخه خارج شي پدې وخت کې خپل دوهم Meiosis انقسام شروع کوي خو دا انقسام هم د Metaphase په مرحله کې توقف کوي. دا حجره د ۲۴ ساعتونو د پاره ژوندي پاتې کېدای شي یعنې که پدې وخت کې د نفیر په تیوب کې سپرماتوزوا موجود نه وی دا حجره د منځه ځي او که په محیط کې سپرماتوزوا موجود وی د سپرماتوزوا د نفوذ (د تخمې د جدار څخه) په وخت کې Secondary Oocyte تنیسه او خپل د Meiosis انقسام تکمیلوی چه د هغه په نتیجه کې دوه نوی حجرات منځته راځي چه یو ئې عبارت د Ootide څخه دی چه په حقیقت کې القاح ته یوه آماده شوی تخمه ده او بله حجره عبارت د Secondary Polar Body څخه ده چه د منځه ځي.



شکل (۳-۵) : د بڼخینه جنسي حجري د تکامل مختلف پړاونه رابڼايي .

په *Oogenesis* هم لکه د *Spermatogenesis* لومړی یو مایټوټیک ویش او بیا وروسته دوه مایټوټیک ویشونه تر سره کېږي .

## د Spermatogenesis او Oogenesis تر منځ توپيرونه

**1- Spermatogenesis** درى مرحلې لري، خو په **Oogenesis** كې دوه مرحلې ليدل كېږي يعنې د ميتامورفوز مرحله په **Oogenesis** كې وجود نلري.

**2- د Oogenesis** او له مرحله په (داخل رحم ژوند) او يا د تولد په اولو مياشتو كې صورت نيسي حال دا چه سپرماتوجينيز د بلوغ د سن په رسيدو سره شروع كېږي.


**3- د Oogenesis** د **Meiosis** د انقسامونو مرحله د بلوغ سن ته د رسيدو نه وروسته په هرو ۲۸ ورځو كې يو ځل صرف په يوه **Oocyte** كې صورت نيسي حال دا چه د بلوغ د سن په رسيدو سره د خصی په منوي كانالو كې د **Spermatogenesis** عمليه شروع او يو بى شميره تعداد **Spermatocyte** خپل د **Meiosis** انقسامونه سرته رسوى.

**4- په Oogenesis** كې د **Meiosis** انقسامونه غير مساوي دي يعنې د يوه **Oogonia** څخه صرف يوه **Ootide** يا تخمه او درى قطبي جسمونه چه د القاح قابليت نلري په وجود راځي حال دا چه په **Spermatogenesis** كې د **Meiosis** انقسامونه مساوي دي، او د يوه **Spermatogonia** څخه څلور عدد **Spermatozoa** چه د القاح قابليت لري تشكيل كوي.

**5- كومى تخمې چه د Oogenesis** په نتيجه كې منځته راځي ټولې د **X** جنسي كروموزومونو درلودنكې دي، حال دا

چہ پہ Spermatogenesis کې ۵۰ فیصدہ X جنسی کروموزومونہ او ۵۰ فیصدہ Y جنسی کروموزومونہ منختہ راځي.






شکل (۳-۶) : کین ارځ ته د نارینه جنسي حجری د تکامل مختلف پړاونه ښکاري، چې د سپرماتو گونیا څخه چې یوه دپلوید حجره ده پیل او په پایله کې سپرم چې یوه هیلوید حجره ده منځ ته راځي. د یوې ارځ ته د ښځینه د جنسي حجری د تکامل مختلف پړاونه راښایي چې د Oogonia څخه چې یوه دپلوید حجره ده پیل او په پایله کې اووم چې یوه هیلوید حجره ده منځ ته راځي.

## څلورم فصل

### د مؤنث جنس په تناسلي سیستم کې سیکلیک تغیرات

د مؤنث جنس په تناسلي ژوند کې ډیره مهمه حادثه د تخمې د مسلسل آزادیدو څخه عبارت ده، چه په هره قمری میاشت یا ۲۸ ورځو کې یو ځل یو Primordial Follicle د خپل نهایی تکامل یا Graafian Follicle مرحلې ته داخل او د تخمې د آزادیدو سبب ګرځي تناسلي ژوند په مؤنث جنس کې د بلوغ د شروع یعنې د ۱۱-۱۶ کلنۍ څخه شروع او تر Menopause یا د ماهوار عادت تر دایمی قطع کېدو یعنې ۴۵-۵۰ کلنۍ پورې دوام کوي، چه تر دی سن وروسته مؤنث جنس د حمل د اخستلو قابلیت نلري او تبيض یا Ovulation صورت نه نیسي. د مؤنث جنس په تناسلي سیستم کې همزمان دوه مختلف سیکلونه صورت نیسي.



شکل (۱-۴) : د فولیکول مختلف ډولونه راښايي.

## Ovarian Cycle -I


عبارت د هغه تغیراتو څخه دي چه د بلوغ د سن په رسیدو سره هره میاشت په مبیض یا تخمدان کې صورت نیسي او درې مرحلې لري:

**Pre Ovulatory Phase -a**: د مبیض د سیکل اوله نیمائې مرحله ده چه پدې مرحله کې د Hypophysis د قدامي فص څخه یو هورمون د S.H.F یا Folliculin Stimulating Hormon په نوم افراز یږی چه د مبیض د فولیکولو د تکامل او د رحم د اندومتريوم د proliferation او د استروجن د هورمون د افزار سبب ګرځي.

**Ovulation Phase -b**: عبارت د Graafian follicle او د مبیض د جدار د څیریدو او د Secondary Oocyte آزادیدو څخه دی، چه د ovarian سیکل په نیمائې کې یعنی په ۱-۱۴ ورځ باندي صورت نیسي، تبيض یا Ovulation د تناسلي ژوند په جریان کې صورت نیسي او په حامله بنځو کې نه لیدل کېږي. خو په هغو مندو کې چه خپلو ماشومانو ته خپلی شیدی ورکوي تبيض ډیر کم صورت نیسي. د تبيض عملیه د Hypophysis د Luteatropin هورمون تر اثر لاندې واقع کېږي د تبيض څخه لږڅه مخکې تخمه او د هغه فولیکولي حجرات د فولیکول د جدار څخه جلا او د فولیکولي مایع فشار زیاتیري په همدی وخت کې د

Collagenase او plasmine د انزیمونو د فعالیت په نتیجه کې د فولیکول او مبيض جدار نازک او د یوې مبارزې نقطې په شکل چه Stigma یا Maculation Folliculi نومیری د مبيض د سطحې څخه را وځي او بالاخره په ۱۴مه ورځ Ovulation صورت نیسي. کله چه تخمه آزاده شي د نفیر د آزاد نهایت Fimbrea د مبيض سطحې ته متوجه او تخمه د نفیر تیوب ته رهنمائي کوي او نه پریردی چه د پریټوان په جوف کې آزاده شي.

**Post Ovulatory Phase -c: Ovarian Cycle**  
 دوهمه نیمائې مرحله ده چه پدې مرحله کې Luteum Corpus تشکل کوي او د Progesterone هورمون افرازوی، دا مرحله د Hypophysis د Hormone Luteinizing یا L.H تر اثر لاندې کنترول کیږي.



شکل (۲-۴) : د Ovarian Cycle مختلف پړاونه ښکاري. د فولیکولونو د پخیدو مرحله (Pre- Ovulatory phase)، د تبيض یا د تخمې د آزادیدو مرحله (Ovulatory phase)، د ژیر جسم د تشکل او انکشاف مرحله (Post Ovulatory phase) په دغه سایکل کې شاملې دي.

## د Corpus Luteum یا

### د ژیر جسم جوړیدل او تکامل

کله چه تخمه آزاده شي ځیری شوی فولیکول او د هغه دانه داره ناحیه ابتداً په Corpus Hemorrhagicum او بیا په Corpus Luteum یا ژیر جسم باندې بدلیری. ژیر جسم یوه مؤقته اندوکرینی غده ده چه د پروجسترون هورمون افرازوی د ژیر جسم تکامل په لاندې مراحلو کې صورت نیسي.

#### **a- Proliferation or Vasculisation Phase:** پدې

مرحله کې د Zona Granulosa فولیکولي حجرات په سرعت سره انقسام کوي او د هغوی د حجراتو په فاصله کې د فولیکول د جدار د داخلي طبقې څخه اوعیه نفوذ کوي.

#### **b- Glandular Meta Morphosis:** پدې مرحله کې

فولیکولي حجرات هایپرتروفی کوي او یو ژیر صباغ یا Pigment د Lutein په نوم په حجراتو کې تراکم کوي.


#### **c- Secretory Phase:** پدې مرحله کې ژیر جسم په افراز

باندې شروع کوي ددې مرحلې مدت متفاوت دی مثلاً که تخمه القاح نه شي دا مرحله ۱۴-۱۲ ورځو پورې دوام کوي چه پدې وخت کې د Corpus Luteum of

Menstruation په نوم یادېږي، او که چېرې تخمه القاح شي او حمل صورت ونیسي نو Corpus Luteum د Progesterone افراز ته د Placenta تر شکل پورې ادامه ورکوي چه پدې وخت کې د Corpus Luteum of Pregnancy پنوم یادېږي. د Corpus Luteum of Menstruation قطر 1cm او د pregnancy قطر 2.5cm ته رسیږي.

**Involution or Regressive Phase** -د پدې مرحله کې د ژپر جسم فعالیت کم او افرازی حجرات ئې اتروفی کوي او د منضم نسج په یوه ندبې یا Scarه چې د Corpus Albicanus (سپین جسم) په نوم یادېږي، تبدیلېږي. چه دا جسم د زیات وخت لپاره په مبيض کې پاتې او بالاخره

جدبېږي



شکل (۳-۴) :  
د تخمدان یوه  
عرضی  
مقطعه .  
علاوه دمبيض  
فولیکولونو  
څخه ژپر  
جسم او د هغه  
بدلون په سپین  
جسم وروسته  
له تبیض څخه  
نیکار .

## Menstruation or Uterine Cycle - I I

عبارت د یوه تعداد تغیراتو څخه دي چه په هره میاشت کې د رحم په مخاطي غشا یا Endometrium کې د میوض د تغیراتو سره همزمان صورت نیسي دا سایکل لاندې مرحلې لري:

**a - Menstrual Phase:** دا مرحله د ۳-۵ ورځو پورې دوام کوي پدې مرحله کې د رحم د اندومتريوم سطحې برخه تخریب او د Vagina له لارې یو ځای د خونریزی سره خارجيږي، ددې خونریزی اوسط مقدار ۶۰-۵۰ سی سی پورې دی او د Proteolytic انزایمو له کبله تخریب یا Coagulation نکوي ددې مرحلې په آخر کې د اندومتريوم ضخامت فوق العاده کميږي یعنې تقریباً د اصلی ضخامت د یو پر لسمې حصې ته رسيږي.


## Post Menstruation or Proliferation Phase.b

دا مرحله لس ورځي په برکې نیسي او د Menstruation په تعقیب شروع کېږي، پدې مرحله کې اندومتريوم د قاعدوی طبقې څخه د استروجن هورمون تر اثر لاندې دوباره په ترمیم شروع کوي. څرنګه چه په عین زمان کې په میوض کې فولیکولونه د تکامل په حال کې وي نو ځکه د Follicular Phase په نوم هم یادېږي.

**c- Premenstruation or secretory phase: دا**

مرحله تقریباً ۱۲ ورځې دوام کوي پدې مرحله کې د اندومتريوم ضخامت اعظمي حد ته رسیری او د رحم غدوات په افراز باندې شروع کوي. چه پدې افراز تو کې د گلايکوجن او Mucin مواد شامل دی. یعنی پدې مرحله کې اندومتريوم ځان د القاح شوی تخمې ځای پرځای کېدو ته آماده کوي. څرنګه چه دا مرحله د مبيض د ژپر جسم د تشکل د مرحلې سره تطابق کوي نو ځکه د Luteal phase په نوم هم یادیرې که حمل صورت ونه نیسي ژپر جسم ۱۲-۱۴ ورځې وروسته د تبيض څخه د منځه ځي او د پروجسترون افراز قطع او په نتیجه کې په عضویت کې د استروجن او پروجسترون هورمون نشتوالی را منځته کېږي او دوباره Menstruation تکراریري. او که حمل صورت ونیسي ژپر جسم تر ۳-۴ میاشتو پورې یعنی د پلاستا د تشکل تر وخته دوام کوي. د پروجسترون افراز په مبيض کې د فولیکولو د پخیدو څخه او په رحم کې د Menstruation د تکرار کېدو څخه جلوگیری کوي.





شکل(۴-۴): په دغه شکل کې ovarian Cycle او Uterine Cycle د خپلو ټولو مرحلو سره ښکاري.

د Ovarian Cycle په جریان کې د مبيض د فولیکولونو پخیدل، تبيض او د تبيض څخه وروسته د ژیر جسم تکامل او په Uterine Cycle کې د اندومتریم د پور یا طبیعي تحولات او تغیرات چه د هورمونو د فعالیت او تاثیر په پایله کې صورت نیسي تر سترگو کیږي.

## پنجم فصل


### Development of the Human

د انسان انفرادي تکامل په دوو اساسی مرحلو باندې ویشل کېږي.

#### **Prenatal period -I**

دا دوره د القاح د عمليې څخه شروع او د ماشوم تر تولد پورې دوام کوي. دا دوره د مور په عضویت کې تیریری او د رحمی ژوند په نوم هم یادیري، تقریباً ۲۶۶ ورځي دوام کوي چه دا ورځي د آخرین Menstruation د اولی ورځي څخه د ولادت تر ورځي پورې محاسبه کېږي دا دوره دري مرحلی لري:

**1-Pre-Organogenesis:** دا مرحله د القاح د عمليې څخه شروع او د حمل د دویمې هفتې تر آخره پورې یعنی د دوه صفحوي ریشم تر شکل پورې دوام کوي. پدې مرحله کې القاح یا Fertilization او د Zygote تشکیل، پارچه کېدل یا Cleavage او د Murola او Blastula تشکیل، غرس کېدل یا Implantation او د Gastrulation مرحلی اول فاز او د دوه صفحوي ریشم تشکیل شامل دی.




شکل (۵-۱) : د زایګوت جوړیدنه او پرمختګ.  
 د سپرم او اووم د یو ځای کېدو څخه وروسته د زایګوت منځ ته راتګ او د زایګوت  
 انګشاف او پرمختګ د ټوټه کېدو یا انشقاق څخه وروسته رانښایي.

**۲- Embryonic Period:** دا دوره د حمل د دریمې

هفتې نه شروع او د اتمې هفتې تر ختم پورې دوام کوي  
 تشکیل شوی موجود ته په دی دوره کې Embryo یا رشیم  
 ویل کېږي، ددې دورې په ختم کې جوړ شوی موجود د  
 انسان مشخصات پیدا کوي. پدې دوره کې د Gastrulation  
 دوهم فاز او درشیمي صفحاتو تشکیل د رشیمي صفحاتو تفریق  
 پذیري د اعضاؤ په منشا باندې، د انساجو تشکیل یا

Histogenesis د اعضاؤ قسمی تشکل او د رشیم د خارجي غشاؤ تشکل یا Extra Embryonic Membranous Formation صورت نیسي. د اتمی هفتې په ختم کې درشیم طول 40mm او وزن ئې 5 گرامو ته رسیږی.

**3- Fetal Period:** دا دوره د نهمې هفتې څخه شروع او د ماشوم تر تولد پورې دوام کوي، تشکېل شوی موجود پدې دوره کې د جنین یا Fetus په نوم یادېږي پدې دوره کې Histogenesis دوام پیدا کوي، Organogenesis او د Systems تشکل صورت نیسي او په آخر کې حاصل شوی موجود د یوه تکامل یافته انسان شکل ځانته غوره کوي.



شکل(۵-۲): د رشیم او جنین انکشاف او تکامل په هره اونۍ کې تر سترگو کیدو .

## Postnatal Period -II

دا دوره د تولد وخت څخه شروع او د ژوند تر آخره پورې دوام کوي.

دا دوره لاندې مراحل لري:

**Neonatal Period -1** یا نوزادی دوره: دا دوره د ولادت دا ولی ورځې څخه د ولادت تر لسمې ورځې پورې دوام کوي.

**Infancy Period -2** یا د شیدو خوړلو دوره: دا دوره د ولادت د یولسمې ورځې څخه تر یو کلنۍ پورې دوام کوي.

**Childhood Period -3** یا د طفولیت دوره: دا دوره د دوهم کال د شروع څخه د یولسم کال تر ختم پورې دوام کوي او درې مرحلې لري:

**Early Childhood -a** یا مقدم طفولیت: دا مرحله د دوه کلنۍ څخه تر څلور کلنۍ پورې دوام کوي.

**Pre School childhood -b**: دا مرحله د پنځه کلنۍ څخه شروع او د شپږ کلنۍ تر ختم پورې دوام کوي.

**Late Childhood -c**: دا مرحله د اوه کلنۍ څخه شروع او د یولس کلنۍ تر ختم پورې دوام کوي.

**Puberty period -4** یا د بلوغ دوره: دا دوره د دولس کلنۍ څخه شروع او د اولس کلنۍ تر ختم پورې دوام کوي.

**5- Adolescence period** یا د ځوانی دوره: دا دوره د

اولس کلنی څخه شروع او یو پښت کلنی تر ختم پورې دوام کوي.

**6- Adult Period** یا د کهولیت دوره: دا دوره د پنځه

ویشت کلنی څخه شروع او تر پنځه شپيته کلنی پورې دوام کوي.



**7- Senescence period** د زړښت دوره: دا دوره د پنځه

شپيته کلنی څخه بره دورې ته ویل کېږي.





























د Prenatal د دورې آخری لس هفتې او د Posnatal د

یوې څخه تر څلورو هفتو د Perinatal Period په نوم

یادېږي.



## Development of the Human

3	<p>15] first missed menstrual period</p>  <p>primitive streak</p>	<p>16] Stage 7 begins</p>  <p>notochordal process</p>	<p>17] intra-embryonic mesoderm</p>  <p>neural plate primitive streak notochord embryonic coelom</p>	<p>18] Stage 8 begins</p>  <p>neural groove somite</p> <p>Heart tubes begin to fuse.</p>	<p>19] neural fold</p>  <p>neural groove somite</p> <p>Thyroid begins to develop.</p>	<p>20] Stage 9 begins</p>  <p>neural groove somite</p> <p>Heart tubes begin to fuse.</p>	<p>21] neural groove</p>  <p>neural groove somite</p> <p>Heart tubes begin to fuse.</p>
4	<p>22] Stage 10 begins</p>  <p>Heart begins to beat</p> <p>Neural folds fusing.</p>	<p>23] rostral neuropore primordia of eye and ear present</p>  <p>rostral neuropore caudal neuropore</p>	<p>24] Stage 11 begins</p>  <p>heart bulge rostral neuropore closes</p>	<p>25] otic pit</p>  <p>otic pit</p> <p>3 pairs of branchial arches</p>	<p>26] Stage 12 begins</p>  <p>Upper limb bud</p> <p>indicates actual size</p>	<p>27] 4 pairs of branchial arches. Upper &amp; lower limb buds present.</p>  <p>4 pairs of branchial arches. Upper &amp; lower limb buds present.</p> <p>C R = crown-rump length.</p>	<p>28] Stage 13 begins</p>  <p>C R : 4.0 mm</p>
5	<p>29] Neural folds fusing.</p>  <p>C R : 5.0 mm</p>	<p>30] Lens pits, optic cups, nasal pits forming.</p>  <p>Lens pits, optic cups, nasal pits forming.</p>	<p>31] developing eye</p>  <p>developing eye primitive mouth</p>	<p>32] Stage 14</p>  <p>Hand plates (paddle-shaped)</p> <p>Lens pits and optic cups formed.</p>	<p>33] Stage 15 begins</p>  <p>hand plate</p> <p>C R : 7.0 mm</p>	<p>34] Head much larger relative to trunk. cerebral vesicles distinct</p>  <p>Head much larger relative to trunk. cerebral vesicles distinct</p> <p>Foot plates present</p>	<p>35] Head much larger relative to trunk. cerebral vesicles distinct</p>  <p>Head much larger relative to trunk. cerebral vesicles distinct</p> <p>Foot plates present</p> <p>C R : 8.0 mm</p>
6	<p>36] Oral &amp; nasal cavities confluent.</p>  <p>Oral &amp; nasal cavities confluent.</p>	<p>37] Stage 16 begins</p>  <p>foot plate</p> <p>C R : 9.0 mm</p>	<p>38] Upper lip formed.</p>  <p>Upper lip formed.</p>	<p>39] Hand plates (paddle-shaped)</p>  <p>Hand plates (paddle-shaped)</p> <p>Lens pits and optic cups formed.</p>	<p>40] Upper limbs bent at elbow. Digital rays and auricular hillocks distinct.</p>  <p>Upper limbs bent at elbow. Digital rays and auricular hillocks distinct.</p> <p>Palate developing.</p>	<p>41] Stage 17 begins</p>  <p>digital rays</p> <p>ventral view</p>	<p>42] Stage 17 begins</p>  <p>digital rays</p> <p>ventral view</p> <p>C R : 13.0 mm</p>

## شپږم فصل (Fertilization)

د انسان د تکامل او انکشاف شروع د القاح د عمليې سره صورت نیسي. القاح عبارت د مذکر ګامیت او مؤنث ګامیت د یو ځای کېدو څخه ده. چه په نتیجه کې ئې یوه واحده حجره د Zygote په نوم شکل کوي یعنې القاح د سپرماتوزوا او Oocyte په تماس سره شروع او د سپرماتوزوا او Oocyte هستو په یو ځای کېدو سره ختمیږي.

زایګوټ یوه القاح شوی تخمه او یا یو حجروي رشیم دی چه په هغه کې د هستی جسامت دوه چنده اما د سائتوپلازم جسامت ثابت پاتې کېږي، د القاح عملیه په انسانانو کې د نفیر د Ampulla په برخه کې صورت نیسي. دا عملیه د Ovulation څخه ۱۲ ساعته وروسته شروع او ۲۴ ساعته په برکې نیسي.

د جنسي مقاربت یا Intercours څخه وروسته سپرماتوزوا د مهبل یا Vagina له لارې لومړی رحم او بیا وروسته نفیر ته داخلېږی چه د سپرماتوزوا په حرکت کې د هغه فلاجیل او د رحم او نفیر د جدار عضلي تقلصات زیات کمک کوي. سپرماتوزوا د مؤنث جنس و تناسلي لارې ته د داخلیدو نه مخکې د القاح قابلیت لري. او د لاندې دوه عملیو نه وروسته د القاح قابلیت پیدا کوي.



**1-Capacitation:** پدې عملیه کې د سپرماتوزوا د رأس کلايکو پروتین پوښ او د منوي مایع پروتینی ماده د یو تعداد انزایمو د فعالیت په نتیجه کې لیری کیږي دا عملیه په رحم او یا نفیر کې د تناسلي جهاز د افرازاتو تر اثر لاندې صورت نیسي او تقریباً ۷ ساعته دوام کوي.

**2-Acrosome Reaction:** د یو سلسله موفولوژیکو تغیراتو څخه عبارت دی چه د سپرماتوزوا د تیریدو د پاره د Corona Radiata او Zona Pellucida څخه صورت نیسي پدې عملیه کې د اکروزوم په غشا کې یو تعداد سوري په وجود راځي چه د انزایمو د خارجیدو سبب ګرځي. کوم انزایمونه چه پدې عملیه کې د اکروزوم څخه خارجيږي په لاندې ډول دی:

Hyaluronidase -a: دا انزایم د سپرماتوزوا په تیریدو کې د Corona Radiata څخه کمک کوي.

Trypsine Like Substance -b: دا انزایم Zona Pellucida منحلوی.

Aerosine -c: دا انزایم هم Zona Pellucida په انحلال کې کمک کوي.

## د القاح مراحل

په القاح کې لاندې درې مرحلې لیدل کېږي.

### 1- اوله مرحله یا Penetration of the Corona Radiata

د ۲۰۰-۳۰۰ میلیونو سپرماتوزوا د جملې څخه چه و مؤنث تناسلي سیستم ته داخلېږي صرف د ۳۰۰-۵۰۰ عددو پورې سپرماتوزوا ځان د القاح محل ته رسوي. چه د هغه د جملې څخه صرف یو سپرماتوزوا تخمه القاح او متباقي د تخمې د جدار څخه د نفوذ په عملیه کې کمک کوي مخکې داسې فکر کېدو چه د Corona Radiata د حجراتو په تخریب کې هیالورونیداز مهم رول لري. خو اوس ثابت شوی چه د سپرماتوزوا په نفوذ کې د Corona Radiata څخه د سپرماتوزوا او د نفیر د مخاط انزایمونه په مشترکه ډول عمل کوي.



### 2- دوهمه مرحله یا Penetration of the zona pellucida

د هغو زیاتو سپرماتوزوا د جملې څخه چه ځان ئې و Zona pellucida ته رسولی، صرف یو سپرماتوزوا کولای شي چه ددې جلا داره غشأ څخه تیر او د تخمې و غشأ ته ځان ورسوي. کله چه یو سپرماتوزوا تخمې ته داخل شي د تخمې د چارج د تغیر سبب ګرځي، چه دا حادثه د نورو سپرماتوزوا د Agglutination سبب ګرځي او یا دا چه پاتې شوی سپرماتوزوا د فولیکولي حجراتو د

phagocytosis د عمليې پواسطه له منځه ځي، په هر صورت په انسانانو کې صرف يو سپرماتوزا و د Zona pellucida څخه تير او تخمې ته نفوذ کوي. نو ځکه ويلاى شو چه په انسانانو کې القاح مونوسپرميک ده.

### 3- درېيمه مرحله Fusion of sperm & Oocyte

**Cell Membrane:** کله چه سپرماتوزوا د تخمې دغشأ سره په تماس کې شي. دا دواړه غشأوى سره يو ځاى اود هغه په تعقيب د سپرماتوزوا رأس و تخمې ته داخليږي، بعضې او قات کېداى شي چه دوه سپرماتوزوا يو ځاى و تخمې ته داخلي شي چه د هغه په نتيجه کې يو داسې رشيم چه ۶۹ کروموزومونه لري تشکل کوي، خو داسې رشيم د يوه اجنبى جسم په شکل ژر تر ژره د عضويت نه دفع کېږي، يعنې سقط يا Abortion صورت نيسي.



شکل (۶-۱) : د القاح مراحل.

په تر نښه سره د تخمې د شعاعي تاج څخه د سپرم نفوذ او تیریدنه یا Penetration of corona radiata، د تخمې د روښانه ناحیې یا Zona Pellucida څخه د سپرم نفوذ یا تیریدنه (Penetration of zona pellucid)، د سپرم او اووم د غشاگانو فیوز کېدل یا Fusion of sperm & Oocyte Cell Membrane تر سترگو کیږي.

د سپرماتوزوا په داخلیدو سره و تخمې ته لاندې تغیرات لیدل کېږي:  
**a-** د *Zona pellucida* کېمیایوي ترکیب تغیر خوری او د نورو سپرماتوزوا د دخول یا *poly spermia* څخه مخنیوی کوي.

**b-** *Oocyte* خپل دوهم *Meiotic* انقسام تکمیلوي.

**c-** د سپرماتوزوا رأس غټیږی او لکې ئې له منځه ځي.

**d-** مذکر او مؤنث *Pronucleus* سره نژدې او هیلوئېد کروموزومونه سره یو ځای کېږي چه په نتیجه کې زایگوت د *Diploid* کروموزومونو درلودنکې هسته شکل کوي.

**e-** د جنیست مشخص کېدل یا *Sex Detremination*

چه دا مساله د *Zygot* د کروموزومونو په ترکیب پورې اړه لري یعنی که د سپرماتوزوا د جنسي کروموزوم نوعیت *X* وی نو آینه رشیم د *XX* کروموزومونو درلودنکې او مؤنث دی. او که د سپرماتوزوا د جنسي کروموزوم نوعیت *Y* وی نو آینه رشیم یا *Zygot* د *XY* کروموزومونو درلودنکې او مذکر دی یعنی د ماشوم جنسیت د پلار په جنسي کروموزومونو پورې اړه لري اما داسې نظریات وجود لري، چه مور هم د آینه جنس په دفع کولو او یا سقط کې مهم رول لوبوی. همدارنگه د سپرماتوزوا د *X* کروموزوم وزن نظر و لا ته زیات دی نو بعضې اوقات د *X* کروموزوم حامل سپرماتوزوا د القاح و محل ته ناوخته رسیری چه د چانس د کمیدو امکان ئې شته.


## Invitro Fertilization یا د عضویت نه بهر القاح

دا ډول القاح د جهان په اکثر و لابر اتوارو کې صورت نیسي. پدې ترتیب چه اول د Gonadotropin هورمونو پواسطه د میوض فولیکولونه تنبیه کېږي. چه د هغه په نتیجه کې د یوه فولیکول نشونما په تخمدان کې صورت نیسي. بیا وروسته د Ovulation نه لږ څه مخکې د یوې آلې پواسطه چه Aspirator نومیری Oocyte چه د خپل اول میوتیک انقسام په آخره مرحله کې قرار لري اخستل کېږي او په یوه مساعد ذریعه وسط یا Culture کې ایښودو څخه فورا وروسته د هغه سره سپرماتوزوا یو ځای کېږي. اول کله چه Zygote د اتو حجراتو په تعداد Cleavage وکړي د وروستي تکامل د پاره د مور د رحم په اندومتريوم کې غرس کېږي. او پدې ترتیب رشیم و خپل تکامل ته دوام ورکوي، خو مهمه خبره پدې نوع القاح کې داده چه تقریباً ۲۰ فیصده القاح شوی تخمې درحم په اندومتريوم کې غرس او تکامل کوي. نو ځکه د حمل چانس پدې نوع میتود کې ډیر کم دی اما ددې کار د مخنیوي د پاره اکثراً څلور یا پنځه القاح شوی تخمې د رحم په اندومتريوم کې غرس کوي. خو بعضې او قات داسې لیدل شوی چه دوه یا درې او یا زیات تعداد رشیم په عین وخت کې تکامل کوي. دوهم مشکل دادی چه د اندومتريوم تغیرات همزمان د کلیواژ سره صورت نه نیسي. ځکه چه د عضویت نه خارج کلیواژ ۲۰-۳۰ فیصده د مور د

عضویت د کلیواژ په تناسب بطی دی، نو اکثراً ددې تغیراتو په وجه د القاح شوی تخمې غرس په مکمله توگه صورت نه نیسي.

## اووم فصل (Cleavage)

د زایګوټ د تشکل نه وروسته کروموزومونه د دوک یا Mitotic Spindle د پاسه قرار نیسي او د نورمال مایټوټیک انقسام د پاره آماده کېږي. تر القاح تقریباً ۳۰ ساعته وروسته په زایګوټ کې متواتر مایټوټیک انقسامونه شروع، ابتدایي زایګوټ په دوو حجرو او بیا په زیاتو حجراتو باندې ویشل کېږي چه د منځ ته راغلو حجراتو جسامت په تدریج سره کمېږي. هغه حجرات چه کلیواژ په نتیجه کې منځ ته راځي د Blastomere په نوم یادېږي.



شکل (۱-۷): د زایګوټ ټوټه کېدل یا انشقاق (Cleavage) ښکاري. زایګوټ په ترتیب سره په دوه حجروي جسم، څلور حجروي جسم، اته حجروي جسم بدل او وروسته بیا مورولا منځ ته راوړي.

کلیواژ د مایټوټیک انقسام سره دوه توپيرونه لري:

**1-** په مایټوټیک انقسام کې کله چه یوه حجره تقسیم شي هغه نمو کوي او بیا ویشل کېږي، حال دا چه په کلیواژ کې حاصله حجرات نمو نه کوي او ویشل کېږي، نو په همدی سبب د



بلاستومیر جسامت په تدریج سره کم او تر هغه وخته پورې ادامه ورکوي چه د هستی او سائتوپلازم تناسب ئې د سوماتیک حجراتو د هستی او سائتوپلازم و نسبت ته نژدې او یا مساوي شي.

**2-** په کلیواژ کې کوم حجرات یا بلاستومیر چه منخته راځي یو د بل سره سخت نښتې وی او په ډیره مشکل یو د بل څخه جلا کېږي، د القاح نه درې ورځي وروسته د زایګوټ د کلیواژ په نتیجه کې یو ساختمان په وجود راځي چه د توت د دانی سره شباهت لري او د Morula په نوم یادېږي. دا ساختمان تقریباً د ۱۶ بلاستومیرو څخه جوړ شوی او په هغه کې دوه ډوله بلاستومیرونه وجود لري:

### **1- Embryoblasts یا Inner Cells Mass: دا**


بلاستومیرونه په مرکزی برخه کې موقعیت لري چه جسامت ئې نسبتاً لوی او لږڅه تاریکه دی چه ددې برخې نه په آینده کې د رشیم انساج تشکیل کوي.

### **2- Trophoblasts یا Outer Cells Mass: دا**


بلاستومیرونه په یوه طبقه کې د امبریوبلاستو په شاوخوا کې قرار لري. جسامت ئې نظر و امبریوبلاست ته کوچنی او حجرات ئې نسبتاً روښانه دی دا حجرات په آینده کې د تروفوبلاست غشا جوړوی چه بیا وروسته په placenta باندې تبدیلېږي.

په انسانانو کې کلیواژ د القاح د اولو ۲۴ ساعتونو په آخر کې شروع او تر ۵-۶ ورځو پورې دوام کوي. رشیم په پنځمه ورځ ۵۶ او په شپږمه ورځ تقریباً ۱۰۷ بلاستومیرونه لري. رشیم په دریمه ورځ د نفیر څخه و رحم ته حرکت کوي او په څلورمه ورځ و رحم ته داخلیری. د رشیم دا حرکت د نفیر د عضلاتو د تقلص او هغه افرازاتو په مرسته صورت نیسي چه په نفیر کې قرار لري. رشیم پدې وخت کې د زرده (زیر) موادو او هغه افرازاتو څخه چه په نفیر کې موجود دي تغذیه کېږي.

د Morula په داخلیدو سره رحم ته، د مرکزی برخې په بلاستومیرونو کې د Zona pellucida څخه یو مقدار مایع داخلیری چه بلاخره په مورولا کې د یوه جوف د تشکیل سبب ګرځي. دا جوف د Blastocoele او حامله رشیم د Blastocyste په نوم یادیري (د څلورمې ورځې آخر) پدې وخت کې امبریوبلاستونه په یوه قطب کې قرار نیسي او تروفوبلاست حجرات هموار او Blastocyte احاطه کوي. په هم دی وخت کې Zona Pellucida هم له منځه ځي او د رشیم و Implantation یا غرس کېدو ته زمینه برابریږي. کله چه رشیم د Blastocyste په شکل و رحم ته داخل شي یوه نیمه الی دوه ورځې په رحم کې په آزاد شکل قرار لري او د غرس کېدو د پاره آماده ګی نیسي او په شپږمه ورځ د تروفوبلاست حجرات د رحم اندومتريوم کې نفوذ کوي.




شکل (۷-۲) : بلاستوسیسټ.  
 چي په هغه کي د داخلي حجراتو کتله (Inner cell mass) يا  
 Embryoblast، د خارجي حجراتو کتله (Outer cell mass) يا  
 Trophoblast او يوه خاليگاه يا Blastocoel تر سترگو کيږي.



شکل (۷-۳) : B، بلاستوسیسټ رانښايي، چي په هغه کي د داخلي حجراتو کتله  
 (Inner cell mass) يا Embryoblast، د خارجي حجراتو کتله (Outer  
 cell mass) يا Trophoblast او يوه خاليگاه يا Blastocoel چي  
 Blastocoel هم ورته ويل کيږي تر سترگو کيږي.  
 C، يو بلاستوسیسټ په اندومتريوم کي د ډويډو يا غرس کيدو په حالت کي  
 رانښايي. د اندومتريوم اښتلي طبقه او ستروما هم تر سترگو کيږي.

## Abnormal Zygots

تقریباً ۵۰ فیصده جوړ شوی Zygots د کروموزومونو د انومالي له کبله غیر نورمال دي او اکثراً د حمل په دویمه او دریمه هفته کې د Spontaneous Abortion سبب ګرځي. دا حادثه د ولادی انومالي د وقوع څخه تر زیاتي اندازی مخنیوی کوي. ځکه که دا حادثه د حمل په مقدمو ورځو کې صورت نه نیولای نو د ولادی انومالی فیصدي به د ۲-۳ فیصده نه و ۱۲ فیصده ته جګه شوی وای.



شکل (۷-۴): د یو غیر نورمال زایګوټ جوړښت رانښایی، چې د ۴۶ عدوو کروموزو پر ځای د ۴۵ عدوو درلودونکی دی.

## اتم فصل

Implantation &  
Bilaminar Germ Disk Formation

Implantation عبارت د رشیم د نفوذ او ځای پرځای کېدو څخه د رحم د اندومتريوم په سطحې طبقه کې دی، چه معمولاً د حمل په شپږمه او یا اومه ورځ شروع او د حمل په دولسمه ورځ ختمیږي. غرس کېدل اغلباً د رحم د جسم په قدامي او یا خلفي جدار کې صورت نیسي، د غرس کېدلو په عملیه کې د رشیم او د مور انساج په مشترک ډول عمل کوي. د غرس کېدلو په جریان کې په رشیم کې لاندې تغیرات منځته راځي:

**1- هغه تروفوبلاست حجرات چه د رشيمي قطب د امبریوبلاستو د پاسه قرار لري په دوو طبقو حجراتو باندي تفریق پذیری کوي:**

**a- Cytotrophoblast**

**b- Syncytium Trophoblast**

دا حجرات د پروتیولیتک انزایمو په افراز سره د رحم د اندومتريوم اپیتل، منضم نسج او اوعیه تخریب او Blastocyste په تدریج سره په هغه کې نفوذ کوي د ا حجرات چه د ګلايکوجن او لیپیدی موادو څخه غنی دي د رشیم د پاره د تغذی یوه مهمه منبع شمیرل کېږي.



**2-** د تروفوبلاست د حجراتو په انکشاف سره په امبریوبلاستو کې یو تعداد خالیگایي په وجود راځي چه د حمل په اتمه ورځ دا خالیگایي سره یو ځای او Amniotic Cavity جوړ وي همزمان د امنیوتیک جوف د شکل سره امبریوبلاستونه په دوو طبقو باندې ویشل کېږي.

**a-Epiblast:** استوانه ئې حجراتو یوه ضخیمه طبقه ده چه د امنیوتیک جوف سره ارتباط لري.

**b-Hypoblast:** د مکعبی حجراتو یوه طبقه ده چه د Blastocoele سره ارتباط لري.

**3-** د Cytotrophoblast څخه یو تعداد حجرات جلا او یوه نازکه Exocoelomic غشا په وجود راځي چه د اغشا د Hypoblast د طبقې سره یو ځای یو بل جوف د Exocoelomic Cavity یا Primitive Yolk Sac پڼوم احاطه کوي.

**4-** د تروفوبلاست د حجراتو څخه یوه بله طبقه د Extra Embryonic Mesoderm پڼوم جلا او د امینون او Yolk Sac په شاوخوا کې قرار نیسي.



شکل (۸-۱): د القاح (اتمه ورځ).

يو پرمختللی بلاستوسيسټ راټیایي، چې په اندومتريوم کې د ډوبیدو په حال کې دی، په هغه کې امبریوبلاست حجرات په دوه طبقو (ایې بلاست او هایپوبلاست) باندي او تروفوبلاست حجرات په ساینټیوتروفوبلاست او سنسیوشیوم تروفوبلاست باندي تفریق پذیري کوي. همدارنگه په ایې بلاست حجراتو کې منځ ته راغلی جوف یا خالیگاه (amniotic cavity) او د نوموړي خالیگاه څخه پورته پاتې حجرات (amnio blast) نسکاري، د ساینټیوتروفوبلاست څخه یو تعداد حجرات جلا او یوه نازکه Exocoelamic غشا په وجود راوړي چه د ا غشا د هایپوبلاست د طبقې سره یو ځای یو بل جوف د Exocoelamic Cavity یا Primitive Yolk Sac پنوم احاطه کوي چې په شکل کې د لیدو وړ دی.


**5-** د حمل په نهمه ورځ په Syncytium Trophoblast کې یو تعداد خالیګاوي د Lacuna په نوم په وجود راځي چه د مور د اندومتريوم دشعريه عروقو د څیری کېدو څخه وروسته دا Lacuna د مور د وینې او د اندومتريوم د غدواتو د افزاتو څخه ډکېږي، دا مایع Embryotroph نومېږي، پدې وخت کې غذايې مواد او اکسیجن د Syncytium Trophoblast او Cyto Trophoblast لارې و Embryonal Disk ته رسېږي وروسته دا نژدې Lacuna سره یو ځای او یو Lacunar Network جوړوي، چه د یوه اسفنجي ماننده ساختمان په شکل په رشيمي قطب کې د primordium placenta منشأ منځته راوړي.

**6-** د حمل په لسمه ورځ کاملاً په اندومتريوم کې غرس او د اندومتريوم تخریب شوی ساحه د فبرین په تشکل او د اپیتل د حجراتو په proliferation سره د منځه ځي.

دا نوع غرس کېدل چه رشيم په مکمله توګه په اندومتريوم کې غرس شي د Inter stitial implantation په نوم یادېږي، چه په انسان او یو تعداد محدودو حیواناتو کې لیدل کېږي.

د رشيم د غرس کېدونه وروسته د حمل په ۱۴-۱۳ ورځ د Primitive Chorionic Villi تشکل کوي. همدارنګه په همدې وخت کې Extra Embryonic coelom په





شکل (۸-۲): په اندومتريوم کې په پشپړه توګه ډوب شوی بلاستوسیسټ .  
 د اندومتريوم تخریب شوی ساحه د فبرين په تشکل او د ایتل د حجراتو په proliferation سره  
 د منځه ځي، په شکل کې د نورو ساختمانونو برسیره Lacunae چې وروسته د مور د وینې  
 به ه اسطه ډکيږي. هم نیکار .


وجود راځي چه ددې په تشکل سره د primitive Yolk sac جسامت کوچنی او د رشيمي ډیسک لاندې Secondary Yolk sac په وجود راځي.

د پورتنیو تغیراتو سره سم Extra Embryonic Mesoderm په دوه طبقو ویشل کیږي.

**-a** Extra Embryonic Somatic Mesoderm: د تروفوبلاست داخلي سطح پوښي.


**-b** Extra Embryonic Splanchnic Mesoderm: د زیرې کپسې خارجي سطح پوښي.

په همدی وخت کې *chorionic Cavity* په وجود راځي چه رشیم، امینون او زرده کپسه د اتصالی ساقی له لارې په هغه کې په مغلق ډول قرار لري. او پدې ډول یو *Bilaminar Germ Disk* په وجود راځي.



شکل (۸-۳):

پدې شکل کې لیدل کېږي چې په سنسیوشیوم تروفوبلاست کې منځ ته راغلی خالیګاوي یا *Lacunae* د مور د وینې په واسطه ښکې شوی دی. *Extra embryonic mesoderm* تر سترګو کیږي چې په دوه طبقو (*Extraembryonic splanchnopleuric mesoderm* او *Extraembryonic somatopleuric mesoderm*) باند تفریق شوی دی.



شکل (۸-۴) :

په شکل کی وینو چی بلاستوسیسٹ، کاملاً به انڈومتریوم کی ڈوب دی او خپلی وڊی او پرمختگ ته ادامه ورکوي.  
 پڏي شکل کی برسیره پر نورو ساختمانونو، Primary villi وینو. همدارنگه Secondary yolk sac هم تر سترگو کيږي.

## د Implantation موقعتونه

Blastocyte اکثراً د رحم د جسم په خلفي جدار او بعضاً په قدامي جدار کې غرس کېږي. خو بعضې اوقات دا غرس کېدل د رحم په سفلي برخه يعني Cervical Canal ته نژدې هم صورت نیسي چه د placenta privea په نوم یاد او د ولادت په وخت کې د ډیرو شدیدو خونریزو او حتی د مرګ سبب ګرځي، بعضې اوقات implantation د رحم څخه خارج صورت نیسي چه د Ectopic Implantation په نوم یادېږي. دا ډول غرس کېدل ۹۰ فیصده د نفیر په امپول کې صورت نیسي چه علت ټي د نفیر او رحم التهابات او یا د نفیر دمجرأ بندیدل پس له القاح څخه دی، دا واقعات چه ۵-۱ فیصده حادثات تشکیلوي، اکثراً په اولو اتو هفتو کې د نفیر د Rupture او د رشیم د تلف کېدو سبب کېږي حتی په بعضې واقعاتو کې د شدیدې خونریزی له کبله د مور حیات په خطر کې اچوي همدارنگه کېدای شي چه Blastocyste د بطن په جوف کې غرس شي چه ډیر نادر حالت دی. خو دا ډول حمل کولای شي چه تر ډیره حده تکامل او انکشاف وکړي او حتی ژوندی ماشوم و منځ ته راشي خو بعضې اوقات د پلاستتا د ارتباط له کبله د حیاتي اعضاؤ سره کېدای شي د شدیدې خونریزی سبب شي، داخل بطني غرس کېدل اکثراً په Douglaspouch کې صورت نیسي.

## د Implantation نه مخنيوي

د Estrogen د لوړ مقدار تجویز د څو ورځو د پاره پس له جنسي مقاربت څخه د غرس کېدو څخه مخنيوي کوي ځکه چه د استروجن د هورمون زیاتوالې د استروجن او پروجسترون هورمونو توازن د منځه وړی او په اندومتريوم کې افزایشی مرحله او غرس کېدل صورت نه نیسي.

## مقدم سقط یا Early Abortion

د حمل ختمیدل د ۲۰ هفتو څخه مخکې په هر علت چه وي د مقدم سقط په نوم یا دیري، خو په اولو دریو هفتو کې ټول سقطونه خود بخودي یا spontaneous وي، او اکثراً بنځه په هغه باندې نه پوهیږي چه حمل ئې نیولی دی او که نه، ځکه چه داسې فکر کوي چه دا د حیضی سیکل تکرار دی. تقریباً ۵۰ فیصده Spontaneous Abortion د Chromosomal Anomaly له امله صورت نیسي.

## نهم فصل



### Gastrulation & Tri Laminar Germ Disk Formation

گسترولیشن هغه عملیه ده چه د هغه په نتیجه کې دوه صفحوي رشيمي ديسک يا Bi Laminar Germ Disk په درې صفحوي رشيمي ديسک يا Tri Laminar Germ Disk باندې تبديل شي. دا عملیه د حمل پر خوارلسمه ورځ شروع او په نولسمه ورځ ختمیږي، د دې عملیې په ختم کې رشيم د Gastrula په نوم ياديږي.

د گاسترولیشن د عملیې په جريان کې د Epiblast د طبقي څخه Ectoderm او د Hypoblast د طبقي څخه Endoderm تشکل کوي. همدارنگه ددې عملیې په جريان کې د حمل پر پنځلسمه ورځ د Epiblast څخه يو تعداد حجرات جلا او Primative streak يا ابتدائي نوار جوړوي. چه دا ابتدائي نوار د حمل تر څلورمې هفتې پورې په فعالانه توگه Embryonic Mesoderm جوړ او په تدريج سره د هغه جسامت کوچنی کېږي او بالاخره Degeneration يا استحاله کوي او له منځه ځي خو بعضې اوقات د هغه بقايا د يوه تومور په شکل چه Teratoma نومیږي او مختلف انساج په برکې نيسي باقي پاتې کېږي. همدارنگه د حمل د دوران پر شپاړسمه ورځ ابتداً Noto Chordal process او بيا

وروسته یو میله مانند ساختمان د Notochord په نوم شکل کوي چه د انسان وسطی محور یا محوری اسکلیت جوړوی چه د هغه نه جمجمه یا Costa-Vertibral Column- Sternum او Cranium شکل کوي.

Notochord خپل پورتنی اکتودرم د عصبي صفحه یا Neural plate د شکل د پاره تنبیه کوي چه د غه د عصبي صفحه منځ ته راتلل او د هغه تړل کېدل د عصبي تیوب یا Neural Tube په منظور د Neurolation په نوم یادیري




شکل (۹-۱): گسترولیشن بیکاری. Primitive node، Primitive Streak او همدارنگه در یو وارو طبقاتو (اکتودرم، میزودرم او اندودرم) جو ریڈل تر سترگو کنیری.



چه د حمل د دوران تر ۲۶ ورځي دوام کوي يعنې په تريبب سره Neural Plate، Neural Fold، Neural Groove او بلاخره Neural Tube شکل ځان ته اختياروی چه د هغه څخه دماغ او شوکې نخاع منځته راځي. همدارنگه د عصبي تيوب د تشکل په وخت کې د دې تيوب په دوو خواو کې يو تعداد حجرات خپل ارتباط د اکتودرم سره قطع کوي او د عصبي تيوب په دوو طرفو کې د يو تعداد متبارزو کتلو په شکل د Neural Crest په نوم تظاهر کوي چه د هغه څخه په آينده کې عصبي عقدات د Meneiges CNS صباغی حجرات او د Adrenal مخ تشکل کوي.

همدارنگه د حمل پر ۱۶ ورځ د کېسه زرده څخه يو ګوته ماننده ساختمان د Allantoise په نوم انکشاف کوي چه په پرنده ګانو او اکثر پستاندارانو کې تنفسي وظيفه او د رشيم دا درارو په ذخيره کې برخه اخلي خو په انسانو کې دا ساختمان



شکل (۹-۲): گسټروليشن  
*Primitive node*، *Primitive Streak* او همدارنگه درېواړه طبقبات (اکتودرم، ميزودرم او اندودرم) او *Neural Plate* تر سترگو کيږي.

ډیر کوچنی او په اولني Hemopoiesis او د مثانی په انکشاف کې برخه اخلي، خو د مثانی په شکل سره دا ساختمان په Urachus باندې تبدیلیږي چه د Umbilical Cord په عرضانی مقطع کې د هغه بقایا لیدل کېدای شي. د Notochord او عصبي تیوب په شکل سره Embryonic Mesoderm د هغه و دوو خواته تبارز کوي او یو ستون د Paraxial Mesoderm په نوم منځته راوړي چه د حمل پر ۲۰ ورځ دا میزودرم په Somites باندې ویشل کېږي چه د حمل تر ۳۰ ورځي پورې ۳۸ جوړې سومیت شکل کوي، دا سومیتونه په مقطع کې مثلثی شکل لري او د هغه د تعداد څخه د رشیم د عمر په تعینولو کې استفاده کېږي. دا دوره د Somite periode په نوم یادېږي هر سومیت درې برخې لري:

**1-Scleratome:** چه د هغه نه د میزانشیم نسج هلوکې او غضاریف منځته راځي.

**2-Dermatome:** ددې برخې نه د جلد د درم طبقه او تحت الجلدي نسج شکل کوي.

**3-Myotome:** دا برخه د عضلاتو د شکل سبب ګرځي.

د Paraxial Mesoderm دوه طرفه نازک پاتې کېږي چه د Laterale plates په نوم سره یادېږي چه د Paraxial

Mesoderm او Laterale plates د اتصال محل ته  
Intermediate Mesoderm ويل کيږي.

Parietal or Somatic Layer: -1


دا طبقه د اکتودرم سره يو ځای د عضويت خارجي جدار  
تشکيلوي.

Splanchnic or Visceral Layer: -2


دا طبقه د اندودرم سره يو ځای د هضمي تيوب جدار جوړ  
وي.

د دې دوو صفحو په منځ کې  
Coelum قرار لري چه دا جوف د Mesothelial نازکې  
غشاوی لکه Pleura, Pericardium او Peritoneum


جوړ وي.



شکل (۹-۳):  
Neural tube  
او د سومیتونو  
بیلای بیلې برخې  
(Sclerotome)  
Dermatome  
او  
Myotome  
ښکاري.



شکل (۹-۴): د عصبی تیوب او نورو ساختمانون جوړیدنه رانښایی.



شکل (۵-۹) : د گسترولیشن جوړیدنه او وروستی انکشافی پړاونه، چې په پایله کې مختلف ساختمانونه منځ ته راځي.

## لسم فصل

### (Embryonic Period)

## د حمل د درېیمې څخه تر اتمې هفتې پورې

د رشمې دورې په جریان کې د دريو رشمې طبقاتو څخه لاندې انساج او اعضا په شکل او تکامل شروع کوي:

### 1- د خارجي صفحي يا Ectoderm مشتقات

د اکتودرم طبقې څخه هغه اعضا او ساختمانونه په وجود راځي چه د عضويت ارتباط د خارجي محيط سره ساتي لکه:

a- CNS يا مرکزی عصبي سيستم.

b- PNS يا محيطی عصبي سيستم.

c- د غور، سترگی او پزی حسي اپیتل.

d- د جلد اپیتل يا Epiderm او د هغه مشتقات لکه وينستان، نوکان، او د جلد غدوات.

e- د Hypophysis غده، Mammary غده، او د ادرينال غدې مغز يا مخ.

f- د غابنونو مينا يا Enamel

### 2- د متوسطې طبقې يا Mesoderm مشتقات

د متوسطې طبقې يا ميزودرم څخه لاندې انساج شکل کوي:

a- د ميزانشيم نسج.

b- هډوکي او کرپندوکي يا غضاريف.

- c- عضلات.**
- d- پښتورگی یا کلیه.**
- e- گونادونه لکه خصیه او تخمدان او د دوی مربوطه کانالونه.**
- f- د Adrenal gland قشر.**
- g- طحال.**
- h- د پلورا، پریټوان او پریکارد مصلی صفحات.**
- i- قلب او اوږه .**
- j- وینه.**

### **3- د داخلي طبقي يا Endoderm مشتقات**

- ددې طبقي څخه ابتدا هضمی تیوب او بیا وروسته لاندې ساختمانونه په وجود راځي.
- a- د تنفسی سیستم اپیتل.**
  - b- د Liver, Pancreas, Para Thyroid, Thyroid او**
  - c- د Tonsil او Thymus د ستروما جوړیدل.**
  - d- دمثانی او احلیل اپیتل.**
  - e- د Tympanic Cavity او Austachian Tube اپیتل.**
- د رشيمي دورې د څلورمې هفتې په آخر کې د رشيم طول 5-8mm په شپږمه هفته کې 10-14mm په اومه هفته کې 17-22mm او په اتمه هفته کې 23-30mm پورې رسیری . ددې دورې په جریان کې د سر اندازه تغیر خوری اطراف، مخ، غوږونه، پزه او سترگی په شکل شروع کوي.

## یوولسم فصل

### د حمل د درېیمې میاشتې د شروع څخه تر تولد وخته پورې (Fetal Period)


دا دوره چه تقریباً ۳۰ هفتې په برکې نیسي د انساجو او اعضاوو د Maturation دوره ده یعنې د انساجو او اعضاوو سریع نشوو نما پدې دوره کې صورت نیسي. په لاندې جدول کې د جنین عمر، طول او وزن په مختلفو دورو کې لیدل کیږي.

وزن	اوږدوالی	میاشت	اونی
10 -45 gr	5 – 8 cm	3	9 – 12
60 –200 gr	9 – 14 cm	4	13 – 16
250 – 450 gr	15 – 19 cm	5	17 – 20
500 – 820 gr	20 -23 cm	6	21 – 24
900 – 1300 gr	24 – 27 cm	7	25 – 28
1400 – 2100 gr	28 – 30 cm	8	29 – 32
2200 – 2900 gr	31 – 34 cm	9	33 – 36
3000 – 3400 gr	35 – 36 cm	10	37 – 40




د درېمې میاشتي په جریان کې جنین د انسان بڼه یا قیافه ځانته غوره کوي. خارجي تناسلي اعضا د ۱۲ هفتې په آخر کې دی اندازی ته رسیری چه د خارجي معاینې پواسطه د هغه جنسیت تعین شي په پنځمه میاشت کې جنین د نازکو ویښتانو پواسطه چه Lanugo Hairs نومیري پوبنل شوی، همدارنگه په همدی پنځمه میاشت کې د جنین

حرکات محسوس کیږي. د رحمی ژوند په آخره کې د جنین جلد د یوې سپین رنگه شحمی مادی پواسطه چه Vernix Casseosa نومیري پوبنل شوی چه ددې مادی په ترکیب کې د جلدي غدواتو چربی مواد لیدل کیږي په نهمه میاشت کې د سر د محیط اندازه د عضویت د هری برخې نه زیاته ده




شکل (۱-۱) :  
جنین د خپلې  
وډي او پرمختگ  
په بیلا بیلو  
پړاونو کې لیدل  
کیږي.

چه دا مسله د ولادې کانال څخه د هغه د تیریدو پر مهال مهمه ده. د ولادت په وخت کې د جنین وزن 3000-3400gr پورې وی چه پدې وخت کې جنسي مشخصات واضح او خصیې په Scrotum کې قرار لري.



شکل (۱۱-۲): د نهه (۹) اونيو يا هفتو يو جنين ښکاري. چې سر يې د نور وجود په پرتله لوی او غټ دی، په Yolk sac کې جنين، په Chorionic cavity کې ښکاري، د کورپون يوه خوا چې د Villi درلودونکې ده د (Chorion frondosum) او بله خوا يې چې صافه او ښويه ده د (Chorion laeve) په نوم ياديږي، د ليو وړ ده.




شکل (۱۱-۴): د دولسو اونيو جنين ليدل راښايي، پوستکي يې جلد يې ډير نرې دي چې د وينې رگونه ځان ښکاره کوي. مخ يې د انسان د مخ بڼه ځان ته غوره کړې، خو غوږونه يې لا تر اوسه ابتدايي حالت لري، جنين د خوځښت لرونکی دی مگر د مور لخوا نه احساسیږي.




شکل (۱۱-۳): د يوولسو (۱۱) اونيو يا هفتو جنين ښکاري. سر يې د نورو اوصافو سره سره ناهموار دی. گوتو او خپورو يې ښه انکشاف کړی دی.

شکل (۵-۱۱) : د  
 رحم په جوف کې یو  
 د (۱۸) اونښو یو  
 جنین راښایي. چې د  
 جبل سروی یا  
 Umbilical cord  
 په واسطه د پلاستنا سره  
 نښتی دی، لیل کيږي.  
 پوستکي یا جلد د  
 تحت الجلدې شحم د  
 کمښت له امله نری  
 ښکاري.  
 پلاستنا د کوتیلایډون  
 او امنیون سره یو  
 ځای لیل کيږي.




شکل (۶-۱۱) : د رحم  
 په جوف کې یو د  
 (۱۹) اونښو جنین په  
 خپل طبیعي وضعیت  
 باتدی ښکاري.  
 جبل سروی یا  
 Umbilical  
 cord  
 او  
 Placenta تر  
 سترگو کيږي.  
 د رحم په جدار  
 کې  
 Myofibroma  
 هم ښکاري.



## د ولادت وخت یا Time of Birth

د ولادت د دقیق وخت ۲۶۶ ورځي یا ۳۸ هفتې وروسته له القاح څخه دی اما د القاح د ورځي تعیینول ډیر گران کار دی. نو ځکه د تولد تاریخ ۲۸۰ ورځي یا ۴۰ هفتې وروسته د آخری Menstruation د اولی ورځي څخه محاسبه کېږي خو بیا هم ځینو مشکلاتو لکه Menstruation Cycle او Ovulation د ورځي د تغیراتو له کبله د ولادت د دقیق وخت تعیینول مشکلات را منځته کوي. که یو جنین د تولد وخت نه مخکې پیدا شي Premature او که د تولد وخت نه وروسته پیدا شي د post Mature په نوم یادېږي.

شکل (۱۱-۷): یو نارمل زیږېدون د مهبل له لپارې را ښایي. البته ۲۶۶ ورځي وروسته له القاح یا ۲۸۰ ورځي وروسته د آخرین عادت ماهوار د لومړی ورځي څخه اټل کېدای شي.



## د جنین غیر نورماله نشوونما

### Abnormal Growth of Fetus

Intra Uterin Growth Retardation یا IUGR هغه اصطلاح ده چه د جنین وزن د تولد په وخت کې تر عادی حالت ۱۰ فیصده کم وی چه تقریباً په هرو لسو ماشومانو کې یو IUGR لیدل کېږي.


د داسې واقعاتو په منځته راتلو کې ۱۰ فیصده Chromosomal Abnormality برخه لري. خو ددې نه علاوه یو تعداد ولادې انتانات لکه Syphilis, Toxoplasmosis, Rubella, Hypertension, Malnutrition, قلبی او کلیوي امراض د اجتماعي او اقتصادي ژوند د سطحي ټیټوالي، د مور عادت د الکول، سگریټ او یو تعداد داروګانو سره هم ددې حادثاتو په را منځته کېدو کې مهم رول لري. همدارنګه د مور د شکر بیماری د Hyper Glycemia له کبله هم اکثراً د post Mature یا مړو ولادتونو سبب ګرځي. کوم ماشومان چه پدې ډول منځته راځي اکثراً په هغوی کې Hypoglycemia, Neurologic Disfunction, Respiratory Distress Syndrome, Hypo Calcemia & Meconium Aspiration لیدل کېږي. د جنسي تغیراتو د معلومولو د پاره اکثراً د Ultra Sound, Amniocentesis یا د امنیوتیک جوف نه د مایع اخستل او یا د کوریون د ذغباتو د Biopsy اخستلو په طریقه کار اخستل کېږي.

## دولسم فصل

### Fetal Membranes and Placenta

د درېمې هفتې په شروع کې تروفوبلاست یوازې ابتدایي ذغابات یا Primary Villi لري وروسته بیا پدې ذغباتو کې میزودرمیک حجرات نفوذ کوي او د اندومتر یوې خواته مخ ته ځي او Secondary Villi جوړوي بلاخره د درېمې هفتې په اخر کې پدې ذغباتو کې اوښه او دویني حجرات تشکیل کوي او Tertiary Villi یا Definitive villi منځ ته راوړي.

دا اوښه د Chorionic Plate او اتصالي ساقی یا Connecting Stalk د اوښه سره ارتباط قایموي او پدې وسیله درشیم د وینې د دوران سره ارتباط منځ ته راوړي د ذغباتو په منځ ته راتلو سره تروفلاست د Chorion په نوم یادیري چه په ابتدا کې د کوریون ټوله سطح د ذغباتو پواسطه پوښل شوی خو د حمل په پیشرفت سره درشیمي قطب ذغابات و خپلی نشو نمأ ته ادامه ورکوي او د Chorion Frondosum په نوم یادیري حال دا چه د غیر رشیمي برخې ذغابات په تدریج سره د منځه ځي او تر دریمې میاشتی پورې د کوریون دا برخه بالکل لوڅه او همواره او د Chorion پنوم یادیري.




شکل (۱۲-۱): د درېیمې اونۍ په پای کې د سومیتونو د تشکیل څخه دمخه رشیم او تروفوبلاستونه راښایي.  
 ثانوي او ثالثي ویلای تروفوبلاستونو ته شعاعي او پیچلي څیره ورکوي، د ویلای گانو تر منځ مسافه کومه چې په سرتاسریزه توگه په تروفوبلاستونو کې لیدل کیږي او د سنسیوسایوم په واسطه پوښلول شوي، سایتوتروفوبلاست حجرات په بشپړه توگه تروفوبلاستونه احاطه کوي او د اندومتريوم سره نیغ په نیغه اړیکي لري.

د مور د رحم د اندومتريوم طبقه پس له Implantation څخه د Decidua په نوم یادېږي. چه د Chorion د Frondosum د Decidua د Decidua Basalis په نوم یادېږي چه یوه متراکمه طبقه ده او د لوی Decidual حجراتو څخه چه په کافی اندازه لیسید او گلايکوجن لري جوړه شوی همدارنگه هغه Decidua Capsularis په نوم او د رحم د پاتې برخې د Decidua د Decidua




Parietalis په نوم يادېږي. د کوريون يوازينی برخه چه د موادو په تبادلله کې برخه اخلي د Chorion Frondosum څخه عبارت ده چه د Decidua Basalis سره يو ځای Placenta جوړ وي.

د حمل په آخر کې د امنيون او کوريون جدارونه سره يو ځای کېږي او يوه مشترکه غشا د Amnio Chorionic Membrane په نوم منځته راوړي چه دا غشا د ولادت نه مخکې د Amniotic Fluid د ضياع کېدو څخه جلوگيری کوي او د ولادت په وخت کې خیري کېږي.



شکل (۱۲-۲): د دوهمې میاشتې په پیل کې د رشیم پرمختگ او انکشاف راښایی. په رشیمي قطب کې گڼ شمیر ویلای په ښه ښه تر سترگو کیږي، په داسې حال کې چې په غیر رشیمي قطب کې ددوی شمیر کم او په ضعیفه توگه پرمختگ او انکشاف کوي.



شکل (۱۲-۳): د جنيني غشاگانو اړيکي د رحم د جدار سره راښايي.  
**A:** د دوهمي مياشتي پای، Yolk sac په Chorionic cavity کې د امنيون او کوريون تر منځ ليدل کېږي، په غير رشيمي قطب کې ويلاى له منځه ځي (Chorion Leave)  
**B:** د درېيمې مياشتي پای، امنيون او کوريون سره فيوز يا (يو) کېږي او د رحم خاليگاه يا Uterine cavity د chorion leave او Decidua parietalis د فيوز کېدو يا يوځای کېدو په پايله کې له منځه ځي

## Placenta پلاستنا

پلاستنا يو Disk ماننده ساختمان دی چه 15-25cm قطر  
 3cm ضخامت او د 500-1000 گرامه وزن لري. دا  
 ساختمان د تولد په وخت کې د رحم د جدار څخه جلا او  
 تقريباً ۳۰ د قيقی وروسته د ولادت څخه د رحم د جوف څخه  
 خارجيږي، د ساختمان له نظره د څلورمې مياشتې په شروع  
 کې په پلاستنا کې دوی برخې ليدل کېږي.

**1-Fetal Part:** دا برخه د Chorion Frondosum

خخه جوړه شوی او د Chorionic Plate پواسطه پوښل شوی ده.

**2-Maternal part:** د Decidua Basalis نه جوړه

شوی او د Decidual Plate پواسطه پوښل شوی ده.


Decidual Plate او Chorionic په منځ کې یو تعداد خالیګاوی د Lacuna په نوم وجود لري چه پدې Lacuna کې د مور وینه موجود ده او د رشیم ذغابات په هغه کې شناور دی.

د څلورمې او پنځمې میاشتی په جریان کې یو تعداد حجابات په Decidua کې منځته راځي چه د ذغاباتو د منځ په خالیګاؤ کې د ننه اما Chorionic Plate ته نه رسیری، دا حجابات د Decidual Septum په نوم یاد او پلاستتا په یو تعداد قطعاتو باندې ویشي او که چېرې د پلاستتا مورنۍ برخه ولیدل شي دا قطعات د متبارز ساختمانو په شکل چه تعداد ئې د ۱۵-۲۰ پورې رسیری واضح لیدل کېږي دا متبارز ساختمانو نه د Cotylidone په نوم یاد او د Decidual Plate پواسطه پوښل شوی دی.


د پلاستتا د نشونما په نتیجه کې د رحم ۱۵-۳۰ فیصده سطح د پلاستتا پواسطه ډکېږي چه همزمان د رحم د توسع سره ده، همدا ډول د Decidua یو لږ مقدار د پلاستتا د جلا

کېدو څخه وروسته په رحم کې پاتې کېږي چه د وروستی خونړی په اثر لیری کېږي.


د پلاستنا جنیني سطح مشترکاً د یوې غشاً پواسطه چه Amnio Chorionic Plate نومېږي پوښل شوی چه پدې صفحه کې یو تعداد شراښن او وریډونه لیدل کېږي چه دا شراښن او وریډونه د جبل سروی یا Umbilical Cord طرف ته د یوه بندل شکل اختیار وي.



شکل (۱۲-۴): د پوره مودې پلاستنا رانښايي  
**A:** جنیني اړخ، کورینونیک صفحه یا Chorionic Plate او سروی پری یا Umbilical Cord د امنیون پواسطه پوښل شوی دي.  
**B:** مورنۍ اړخ، چې Cotyledons رانښايي چې په یوه برخه کې دیسیډوی وړ څخه پورته شوی.




شکل (۱۲-۵): د حمل یا پلارتوب په دوهمه نیمایي کې پلاسنتا راښايي. کورتیلايډونونه په قسمي توګه د مورنۍ ډیسیډوی پردو پواسطه سره بېلې شوي دي، د ویلای خالیګاوو تر منځ د موجودې وینې بېره اندازه د انډومتريوم د ورېدونو پواسطه د مور د وینې دوران ته ګرځي او د وینې لږه اندازه ګاونډي (خنګ) کورتیلايډون ته داخلېږي. بین الویلای خالیګاوې د سنسیوشیوم پواسطه پوښل شوي دي.



## Circulation of Placenta یا د پلاستا د وینې دوران

د پلاستا و خالیگاوو ته وینه د رحم د ۱۰۰-۸۰ حلقوي شراینو پواسطه رسیږي. څرنګه چه ددې شراینو فشار لوړ دی نو ځکه د هغه وینه د ذغاباتو په ژوره برخه کې لیدل کېږي. خو کله چه پدې شراینو کې د وینې فشار کم شي وینه د Chorionic Plate څخه د Decidual Plate خواته ځي او د اندومتريوم په وريدونو کې تخلیه کېږي. په عموي صورت د ذغاباتو د منځ په خالیگاؤ کې تقریباً ۱۵۰ ملی لیتره وینه وجود لري چه په هره دقیقه کې تقریباً درى يا څلور ځلی تعویض کېږي.



هغه غشاً چه د مور د وینې دوران د پلاستتا د دوران څخه جلا کوي د Placental Barrier په نوم یادېږي. او په هغه کې څلور طبقې و جود لري.

**a-** د جنین د اوعیې اندوتیلیوم.


**b-** د ذغاباتو د محور منضم نسج.

**c-** د Cytotrophoblast طبقه.

**d-** د Syncytium Trophoblast طبقه.

د څلورمې میاشتی نه وروسته Placental Barrier ډیره نازکه کیږي. ځکه چه Cytotrophoblast طبقه د منځه ځي او د جنین اوعیه مستقیماً د Syncytium سره په تماس کې کیږي بعضې او قات دا طبقه هم د منځه ځي او د هغه ځای د فبرین سره مشابه مواد چه د پلازما او سایتوتروفوبلاست د تجزیې محصولات دی نیسي. دا مواد د Langhans Fibrinoid په نوم یادېږي.





شکل (۱۲-۷) : د کوریونیک ویلی آرتریکی-وینوس ( شریانی - وریدي شعري سیستم ) رانمایی. شراین له جنین څخه اکسیجن نه لرونکی وینه او بیکاره تولید شوي مواد لیردوي، بداسي حال کې چې ورید اکسیجن لرونکی وینه او غذایي مواد جنین ته رارسوي.



## د پلاستتا وظيفه

د پلاستتا وظيفه د مور او جنين په منځ كې د موادو تبادله د يو تعداد هورمونو توليد او د ميتابوليكو موادو اطراح ده.

### 1- د موادو تبادله

**a-** د ګازاتو تبادله: جنين په يوه د قيقه كې د ۲۰-۳۰ ملي ليترو پورې اكسيجن د مور د وينې څخه اخلي او د هغه په عوض كې كاربن دای اكسايد د مور وينې ته انتقالوی دا تبادله د Diffusion يا ساده انتشار د لارې صورت نيسي.

**b-** غذائي موادو او الكتروليتو تبادله: امينو اسيد، شحمی اسيدونه، كاربوهايډريت، ویتامينونه او يو تعداد الكتروليت د پلاستتا د مانعی له لارې د مور څخه و ماشوم ته تيريري.

**c-** د انتی بادی انتقال: د مور انتی بادی د Pinocytosis د عمليې پواسطه و جنين ته انتقالېږي د همدی ګاماګلوبولين انتقال و جنين ته د ماشوم د معافیت سبب د يو تعداد امراضو لکه د يفتري، چچك، سرخكان يا شري او داسې نورو امراضو په مقابل كې كېږي.

Rh Factor چه په حقيقت كې د Erythrocyte يو خاص انتی جن دی د هغه د عدم توافق په نتیجه كې ځنی مهم حادثات را منځته كېږي، مثلا كه جنين (Rh +) او مور (Rh -) وي د جنين Erythrocyte د مور د وينې و دوران ته

داخليدلای شي او د هغه مربوط انتی بادی هلته تولید وی چه بیا وروسته دا د مور انتی بادی د وینې له لارې و جنین ته انتقال او د جنین د Erythrocytes د تخریب سبب ګرځي. د ذغاباتو د سطحې کوچنی خونريزي احتمالاً د انتی جن او انتی بادی د تعامل سبب کېږي د جنین د اريتروسیت تخریب چه د Erythroblastosis Fetalis په نوم یادېږي کېدای شي چه د جنین د مرګ سبب د رحم په داخل او یا د ولادت څخه وروسته د جنین د هلاکت سبب شي.

Transfusion یا د وینې انتقال و جنین ته د رحم په داخل کې او یا پس له تولده د جنین د هلاکت څخه مخنیوي کوي. د ولادت په جریان کې کله چه پلاسنتا د رحم څخه جلا کېږي د یو تعداد ذغاباتو اوعیه Rupture کوي. چه په نتیجه کې د جنین یو مقدار وینه د مور و دوران ته داخلېږي. په هغه صورت کې چه د مور RH منفي او د جنین RH مثبت وی د جنین اريتروسیت د مور په وینه کې د دايمي انتی بادی د جوړیدو سبب ګرځي چه په آینده ولادتو کې د جنین د شدید عکس العمل یا تلف کېدو سبب ګرځي.

ددې حادثو د مخنیوي د پاره د Anti Rh Factor یا Rohgam څخه په لوړ مقدار باندې استفاده کېږي. یعنی د ولادت څخه څو ساعته مخکې Rohgam و مور ته زرق کېږي چه دا درمل د جنین د سروکرویاتو د تخریب سبب ګرځي او د پورتنی حادثی څخه مخنیوي کوي.

**d-** د انتانی عواملو انتقال: که څه هم د پلاسنتا مانعه د یوه د فاعی فکتور په شکل د موادو د تیریدو څخه و جنین ته مخنیوی کوي، خو بیا هم یو زیات تعداد ویروسونه لکه، Chicken Rubella, Poliomyelitis, Measles, pox, او داسې نور د پلاسنتا د مانعی څخه تیر او د جنین د سؤ تشکلاتو سبب ګرځي. همدارنگه د Syphilis عامل یا Treponema Pallidum او یو تعداد نور بکتریائي او پرازیتی عوامل ددې مانعی څخه تیریری.

**e- درمل:** یو زیات تعداد درمل د پلاسنتا د مانعی څخه تیر او د جنین د سؤ تشکلاتو سبب ګرځي.

## 2- د هورمونو تولید

**a- Progesterone:** د حمل د دوران د څلورمی میاشتی په جریان کې پلاسنتا د پروجسترون د هورمون د تولیدولو قابلیت پیدا کوي. چه پدې ترتیب د Corpus Luteum فعالیت له منځه ځي.

**b- Estrogen:** د پلاسنتا د شروع څخه د حمل تر آخره پورې دا هورمون افرازوی چه د حمل په آخر و ورځو کې د ټډې د غدې د انکشاف په منظور ددې هورمون افراز اعظمي حد ته رسیږی.

### **Human Chorionic Gonadotropin -c**

**Hormone** یا **H.C.G.H**: د ا هورمون د حمل په لومړيو ورځو کې د Cytotrophoblast پواسطه افراز او په لسمه هفته کې خپل اعظمي حد ته رسیری ددې هورمونو موجودیت د حمل په اولو دريو مياشتو کې د حمل پر موجودیت باندې دلالت کوي چي د جنين د تشخيص د پاره يو مهم فکتور شميرل کيږي. ددې هورمون مقدار په دو ګانګی، Chorio Carcinoma او Hydatiform Mole کې فوق العاده لوړ دی.

### **Human Chorionic Somatotropin.H -d**

#### **Human Placental Lactogen (H.C.S.H)** یا

**(H.P.L)**: د ا هورمون د Hypophysis د Growth.H

سره شباهت لري چه د ميتا بوليزم د تنبيه څخه علاوه د ثدي د غدي د نشؤنماً او Lactation سبب ګرځي.

### **Thyro Tropin.H -e**: پدې اواخرو کې ددې هورمون

توليد هم د پلاستنا پواسطه تثبيت شوی دی.

### **3- د ميتابوليک موادو اطراح**

يو تعداد ميتابوليک مواد لکه Urea، Uric Acid او

Bilirubin چه د جنين پواسطه توليديږي د پلاستنا د لارې د


مور عضویت ته داخليږي.

## Umbilical Cord یا هبل سروی

یو رسی ماننده ارتباطی ساختمان دی چه د پلاستنا او جنین په منځ کې قرار لري ددې ساختمان طول 50-60cm او قطر 2cm دی، د هبل سروی زیات اوږدوآلې ممکن د جنین په غاړه کې حلقه شي او د جنین د خفق کېدو حادثه را منځ ته کړي، همدارنگه که هبل سروی ډیر لنډ وي د ولادت په وخت کې مشکلات را منځته کوي او د شلیدویا غوڅیدو امکاناتو ئې ډیر دي، هبل سروی د خارج څخه د Amniotic Membrane پواسطه پوښل شوی دی همدارنگه په هبل سروی کې د یو Vena Umbilicalis او دوو Art.Umbilicalis څخه علاوه د Vitiline Duct او Allantois بقایا هم وجود لري چه دا ټول ساختمانونه په یو Jelly مانند ماده کې چه Jelly of Wharton نومیري قرار لري.

دا Jelly ماننده ماده د هبل سروی د پاره یوه محافظوی طبقه ده او د گلایکوپروتین مادې څخه جوړه شوی ده. Umbilical Vein شریانی او Umbilical Arteries وریدی وینه لري.





شکل (۱۲-۸) : حبل سروي يا Umbilical cord ښکاري.  
 د حبل سروي دوه شريانونه او يو وريد او د هغوی اړيکي پلاستنا او جنين سره تر  
 سترگو کيږي.

## Amniotic Fluid امنيوتیک مايع

د امنيون جوف د اوبو په شان د يوې روښانه مايع پواسطه چه د Amniotic Fluid نوميرې ډک شوی دی. ددې مايع يو لږ مقدار د امنيوتیک حجراتو پواسطه او زياته برخه ئې د وينې څخه فلتر کيږي. ددې مايع مقدار په لسمه هفته کې ۳۰ ملی ليتره، په شلمه هفته کې ۳۵۰ ملی ليتره، او په ۳۷ هفته کې و ۱۰۰۰-۸۰۰ ملی ليتره پورې رسيږي. د حمل په اولو

مياشتو کپې جنين د حبل سروی پواسطه پدې مايع کپې په مغلق ډول قرار لري. دا مايع لاندې وظايف اجرا کوي:

**1-** د جنين دمحافظی سبب ګرځي.

**2-** د جنين د عضويت اضافی مواد جذبوی.

**3-** د جنين د حرکاتو د پاره زمينه مساعد وی.


امنيوتیک مايع په هرو دريو ساعتونو کپې تبديلیږي يعنې د موادو يوه سریع تبادلې د امنيوتیک مايع او د مور د دوران تر منځ موجوده ده.

د حمل په آخره کپې کله چه د جنين بښتورګي فعاله شي د جنين ادرار هم امنيوتیک مايع ته داخلېږي. خو ددې ادرارو زیاته برخه اوبه دی ځکه چه د اکثرو ميتابوليکو موادو تبادلې د پلاستتاله لارې صورت نیسي. همدا ډول د ولادت په وخت کپې د همدی مايع د فشار په اثر په ولادی کانال کپې توسع منځته راځي.

که دامنيوتیک مايع مقدار زیات شي د Hydramnios په نوم یادېږي. چه پدې واقعه کپې دامنيوتیک مايع مقدار و ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ملی لیټرو پورې رسیږي.

او که چېرې دامنيوتیک مايع مقدار کم شي د Oligohydramnios حادثه رامنځته کوي چه پدې واقعه کپې دامنيوتیک مايع مقدار و ۴۰۰ ملی لیټرو ته راکمیږي. دواړه حالتې د جنين د انومالي سبب ګرځي چه د هغه په

عواملو کې زیاته فیصدی Idiopathic او ۲۵ فیصده د مور د شکر مرض د یادولو وړ دی. مهم اختلالات چه ددې واقعاتو په اثر را منځته کېږي عبارت د CNS د اختلالاتو او د مری Atresia دي. Oligohydramniosه ډیر کم لیدل کېږي او کېدای شي چه د هغه علت د کلیو یا بښتورگو عدم تشکیل وی.




شکل (۱۲-۹) : امنیوتیک مایع راښایی  
یوه شفافه ژیر بښنه مایع ده چی جنین یې احاطه کړی او د هغه د ساتنی لامل  
ګرځي.



## Twins یا دوگانگی

### Di Zygotic Twins -1

د دوگانگی معمول ترین شکل دی، پدې نوع دوگانگی کې همزمان دوی تخمې د دوو سپرماتوزوا پواسطه القاح کېږي چه دواړه زایکوټونه د متفاوتو جنیټیکې اوصافو درلودنکي دي، کېدای شي یو جنس او یا د مختلفو جنسونو څخه وی. پدې نوع دوگانگی کې هر Zygote په جلا توګه په رحم کې غرس او مستقل پلا سنتا، امینون او کوریون لري. دا نوع دوگانگی د Fraternal Twins په نوم هم یادېږي، ددې نوع دوگانگی واقعات ۷-۱۱ پورې په هرو ۱۰۰۰ ولادتو کې دی.



شکل (۱۰-۱۲): دواړه زایکوټیک دوګانه ګي رابنمایي لکه چې لیدل کېږي دوه تخمې د دوه سپرمونو په واسطه په ځانګړي توګه القاح شوي، او هر زایکوټ په جلا، جلا توګه په رحم کې ډوبیږي.


## Mono Zygotic Twins - 2

پدې نوع دوگانگی کې د جنین تکامل د یوې القاح شوی تخمې او یا یوه Zygote څخه صورت نیسي چې د Identical Twins په نوم هم یادېږي. د انواع دوگانگی د Zygote د ماتیدو په اثر د تکامل په مختلفو مراحلو کې صورت نیسي. خو زیات احتمال د یوه دوه حجروي Zygote دی یعنې کله چه رشیم دوه حجروي وی دواړه یو د بل څخه جلا او د جداگانه زایگوت په شکل و خپل تکامل ته ادامه ورکوي چه هر رشیم مستقل او یا مشترکه پلاستنتا لري ولی آمینوتیک جوف ئې جلا وی.

د وینې ګروپ، د ګوتو نښان، قیافه، د سترګو او وینښتانو رنگ یو او بل ته شباهت لري. مونو زایگوتیک دوگانگی واقعات ۳-۴ پورې په هرو ۱۰۰۰ ولادتو کې دی.

د دوگانگی احتمال په سپین پوستانو کې 1,08 فیصده او په تور پوستانو کې 1,36 فیصده وی. چه ددې د جملې څخه 70 فیصده Di Zygotic Twins او ۳۰ فیصده Mono Zygotic Twins دي، همدا ډول په هرو ۷۶۰۰ حملو کې یو سه ګانه هم امکان لري. څلور او یا زیات تعداد غیر معمول دی. که څه هم د څوګانه ولادتونو علت په څرګند ډول معلوم نه دی خو داسې نظر وجود لري چه هغه ښځې چه د تخمدان د عدم کفایه په خاطر Gonadotropin هورمونو

## استعمالوی دا واقعات ډیر لیدل کېږي. یا Fertility Drugs یا Anti Sterility



شکل (۱۱-۱۲): مونوزایگوتیک دوګانه ګي رانښايي لکه چې لیدل کېږي یوه تخمه د یوه سپرم په واسطه القاح شوی، او یو زایګوت منځ ته راوړي. خو بیا وروسته د توته کېدو یا انشقاق په مختلفو پړاونو( خصوصاً د دوه حجروي جسم په پړاوو کې) سره بیلېږي او هره بېله شوې توته خپلې ودې ته ادامه ورکوي، چه هر رشمیم مستقل او یا مشترکه پلاسنتا لري ولی آمنیوتیک جوف بې جلا وی.

### 3- Conjoins Twins یا وصل شوی دوګانګي



د Zygot تجربه او ماتیدل د تکامل په وروستيو مراحلو کې اکثراً د اتصالي یا نښتو دوګانګی سبب ګرځي. دا نوع دوګانګی په لاندې اشکالو لیدل کېږي.

**Thoraco Pagus -a**: پدې نوع دوګانګی کې دواړه جینونونه په صدري ناحیه کې سره وصل وی.

**-b Pygo Pagus:** پدې نوع دوگانگی کې دواړه جنینونه په قطنی ناحیه کې سره وصل وی.

**-c Cranio pagus:** دا نوع دوگانگی د جمجمی پواسطه یو د بل سره وصل وی.

بعضې اوقات Pono Zygotic Partner د یوه نازک جلدي پل پواسطه سره وصل وی چه د جراحی عملیې پواسطه یو د بل څخه جلا کېږي.



شکل : د وصل شوو یا نېټنو دوگانگی گانو مختلف ډولونه راښايی

## د یار لسم فصل


### Fetal Circulation یا د جنین دویني دوران

د جنین قلبی و عاڼې سیستم داسې جوړ شوی چه د ولادت نه مخکې د Prenatal د دورې ضرورت پوره کوي او د ولادت نه وروسته د Post Natal د دورې د پاره ځان عیاروي.

اکسیجن لرونکې وینه د Vena Umbilicalis له لارې د پلاستا پواسطه د جنین د کبد په کمک د جنین و عضویت ته داخلېږي. ددې وینې یو مقدار د کبد د تغذئې پخاطر د کبد په Sinusoide کې ویشل کېږي خو ددې وینې زیاته برخه د Vena Porta د وینې سره یو ځای د Ductus Venosus له لارې Vena Cava Inf ته داخل اوښی زړه ته ځي دا وینه کله چه Right Atrium ته داخله شي د Crista Dividens عضلي پواسطه په دوو جریانو باندې ویشل کېږي. یو جریان ئې د Foramen Oval له لارې و Left Atrium ته ځي چه تقریباً د V.C.I پنځه او یا فیصده وینه تشکیلوي. دا وینه په Left Atrium کې د ریوې وریدونو د وینې سره یو ځای کېږي او د هغه ځای څخه و Left Ventricle ته ځي او د هغه ځای څخه د Aorta

Ascendens پواسطه د زړه، رأس، عنق او علوی اطرافو و شراینو ته پمپ کیږي.

د V.C.I پاتې ۲۵ فیصده وینه په Right Atrium کې د V.C.S او د قلب د Sinus وینې سره د مخلوط کېدو څخه وروسته و Right Ventricle ته ځي چه د هغه ځای څخه یو لږ مقدار د ریوی شریان پواسطه ورید ته د تغذیې په خاطر او یو مقدار ئې د Ductus Arteriosus له لارې و Aorta Descendens ته انتقالیږي چه د نازله ابهر له لارې د بدن و سفلي برخو ته او بالاخره د دوه Art.Umbilicalis پواسطه د دوباره و پلاستتا ته ځي Ductus Arteriosus په جنیني د وران کې Trancus Pulmonary د Aorta سره وصلوي.




د تولد په وخت کې د تنفسی سیستم په فعالیتو سره د پلورا د جوف فشار د فکتاً کم او ریه غټیږی چه په نتیجه کې په ریوې شریان او وریدونو کې فشار کم او د وینې جریان په هغه کې زیاتیری چه پدې وخت کې د وینې فشار په Left Atrium کې زیات او په Right Atrium او V.C.I کې د پلاستا د دوران د قطع کېدو په اثر کمیږی چه د ا د فشار تفاوت د Left Atrium او Right Atrium په منځ کې د Foramen Oval ټول کېدو سبب ګرځي دا سوری د منضم نسج پواسطه بند او په Fossa Oval باندې بدلیری.

څرنګه چه د پلاستا او ماشوم ارتباط قطع کیږي نو هغه مقدار وینه چه مخکې پلاستا ته تلله او س عمومي د وران ته ځي، نو پدې وجه عمومي دوران فشار هم لوړیږی چه ددې لوړ فشار په اثر د وینې مقدار په Aorta Descendens کې زیاتیری خو برخلاف د ریوې شریان او وریدونو فشار کم وی، نو هغه وینه چه په جنیني حالت کې د Ductus Arteriosus پواسطه د ریوې شریان څخه و Aorta ته تلله توقف او دا قنات Atresia کوي او په Lig.Arteriosus توقف او د وینې تبدیلیږی او په نتیجه کې د عضویت نورمال د وینې دوران بر قراریری.

د تولد سره سم Foramen Oval په Ductus Arteriosus, Fossa Oval په Art.Umbilicalis, Lig.Arteriosus, Medial Umbilical ligament په


،Lig. Teres Hepatis په Vena Umbilicalis  
Ductus Venosus په Lig. Venosum باندې  
بدلیږی.




د کاهل د ويني د دوران شيعا



### Fetal Circulation



شکل (۱-۱۳): د جنین د وینی دوران راښایی




شکل (۱۳-۲): د جنین د وینې دوران رابښایی

## خوار لسم فصل

### Congenital Malformation

#### یا ولادی سؤ تشکلات

ولادی سؤ تشکلات هغه Macroscopic ساختمانی Defect یا کموالي دی چه د ولادت په وخت کې لیدل کېږي. د ولادی سؤ تشکلاتو او د هغه د عواملو مطالعه د Teratology په نوم یادېږي.



Congenital cataract

ټول هغه ماشومان چه ژوندې تولد کېږي د هغه 3,2 فیصده کېدای شي چه یو یا څو ولادی سؤ تشکله ولري او د تولد په وخت کې تشخیص شي، خو د اول کال په آخر کې ددې فیصدی تعداد دوه چنده کېږي ځکه چه د بعضي

ولادی تشکلاتو تشخیص د ولادت په وخت کې ناممکنه دی. د Teratogenic فکتورونو ۱۰ فیصده کروموزومی او جنتیکې عوامل او متباقي یو تعداد فکتورونه دی چه په لاندې ډول توضیح کیږي.

## Infecteus Agents - I

**1- Rubella** یا **German measles**: دا ویروسی بیماری د غورونو د انومالي لکه Congenital Deafness د سترګو سو تشکلات لکه Cataract او همدارنگه د زړه او غابونو د انومالي سبب ګرځي.

**2- Cytomegalo Virus**: د Blindness, Microcephaly او Hepatosplenomegaly سبب ګرځي.

**3- Herpes Simplex**: د Hepato Splenomegaly, Mental Retardation او Microphthalmy, Microcephaly سبب ګرځي.

**4- H.I.V** یا **Human Immuno Deficiency Virus**: اکثراً د Growth Retardation, Microcephaly او Abnormal Facies سبب ګرځي.

5- یو تعداد نور ویروسی امراض لکه Chicken pox, poliomyelitis, Hepatitis, Mumps, Measles, Influenza هم د ولادی سؤ تشکلاتو په منځ ته راتلو کې برخه اخلي خو ددې انومالیو شدت نسبتاً کم دی.

6- **Toxoplasmosis**: کومه مور چه د **Toxoplasma** **Gonadi** پواسطه منتنه شوی وې د هغه ماشومان د

**Hydrocephaly**

او **Mental**

**Retardation**

انومالي لري.

7- **Syphilis**:

پخوا څخه سفلیس

د ولادی انومالي

عمده عامل گڼل

کېږي دا انومالي

عبـارت د


**Congenital**

او **Deafness**

**Mental**

**Retardation**


څخه دي.



**Hydrocephaly**



*Cleft lip*



*cleft palate*

## Radation -II

د یو تعداد تشعشعاتو لکه X د شعاع دوامداره اخستل د یو تعداد ولادی انومالیو سبب ګرځی. دا انومالی عبارت د:

Blindness

Microcephaly, Cleft palate, Cleft Lip او داسې

نورو څخه دي، ځکه چه د مختلفو شعاعو لوړ مقدار اکثراً د

جنسي حجراتو د Mutation او د هغه په نتیجه کې په آینده

نسل کې د سو تشکلاتو سبب ګرځي.

**Chemical Agents -III**

یو تعداد کیمیاوي مواد او درمل هم د ولادی سؤ تشکلاتو سبب ګرځي. هغه درمل چه زیاتره دانومالي سبب ګرځي په لاندې ډول دي:

Thalidomide چه یوه د استفراق ضد دوا ده اکثرأ د هډوکو، قلب او کولمو د سؤ تشکلاتو سبب ګرځي.

Phenytoine چه د اختلاج یا Convulsion ضد دوا ده او اکثرأ په Epilepsy کې استعمالیږی د Mental Retardation, Cleft Lip Hypoplasia او Cleft Palate او داسې نورو سؤ تشکلاتو سبب ګرځي.

Anti Depressant داروګان لکه Meprobamate او Diazepam, chlodiazepoxide, Phenthiazin داسې نور هم د یوه تعداد سؤ تشکلاتو سبب ګرځي.

همدارنگه Chloroquin د سترګی د شبکې، Rifampicin د Cleft Lip او Cleft Palate، Aspirin د CNS او اسـ کـلیـت، Gentamicin، kanamycin او Streptomycin د اتـم عـصب، Tetracyclin د Vestibule Cochlear هډوکو او غاښونو د عدم نشؤ نمأ او Co-Trimoxazol د Cleft palate او داسې نورو سؤ تشکلاتو سبب ګرځي.

د Vit-A زیات استعمال د Hydrocephaly، Cleft Palate او داسې نورو سؤ تشکلاتو سبب ګرځي.

د سگریټ څکول د حمل په دوران کې د کوچنیو ماشومانو د تولد سبب ګرځي. همدارنګه د الکولو استعمال د حمل په جریان کې د جنین د نشو نمأ او انکشاف د پاره ډیر مضر دي.

#### **Hormones -IV**

د حمل په دوران کې د سقط د جلوگیری په خاطر یو تعداد هورمونونه لکه Ethisterone او Norethisterone زیات استعمالیږي. استعمالیږي چه دا هورمونه د مؤنث جنس د Musculization یا تذکیر سبب ګرځي. د Insuline هورمون استعمال د شکر په مریضانو کې د مړو ولادتونو او غیر نورمالو ماشومانو د تولد سبب ګرځي. د Cortison د هورمون Teratogenic تاثیر په انسانانو کې تر اوسه پورې نه دی ثابت شوی خو په یو تعداد حیواناتو کې د Cleft palate سبب ګرځي.

#### **Nutritional Deficiency -V**

که څه هم د غذایي موادو او یو تعداد ویتامینو کموالي د ولادی انومالي سبب ګرځي اما په استثنای توګه د Endemic Cretinism چه په مور کې د ایودین د کموالي له کبله د ماشوم د ولادی سؤ تشکل سبب ګرځي، بل کوم داسې ولادی انومالي د تشخیص د پاره کافی شواهد په لاس کې نلرو.



## Chromosomal & Genetical Factors -VI

کروموزومی او جنتیکې عوامل په لاندې ډول دي:

### 1- Numerical Abnormality یا رقمي انومالی

#### A- Autosome سوماتیک کروموزونو انومالی: په عادی

حالت کې یوه سوماتیک حجری ۴۶ کروموزومونه لري، که په دی تعداد کې تغیر راشي د انومالی سبب ګرځي. مثلاً که چېری د یوې جوړې کروموزومو په عوض دری کروموزومونه وجود ولري دا حادثه د Trisomy په نوم یادیرې همدارنگه که یو کروموزوم د عادی حالت نه په یوه جوړه کې کم وی نو بیا د Monosomy په نوم یادیرې.

#### a- 21 Trisomy یا Dawn Syndrome: دا واقعه ۷۵



Dawn Syndrome

فیصده د کروموزوم د نه جلا کېدو په اثر د Oogenesis په عملیه کې او ۲۵ فیصده د کروموزومو د نه جلا کېدو په اثر د Spermatogenesis د عملیې پواسطه منځته راځي. دا سندروم په

هغه میندو کې چه عمر یې ۲۵ او یا د هغه څخه کم وی یوه واقعه په ۲۰۰۰ ولادتونو کې او د ۴۰ کالو په عمر کې یوې واقعی ته په ۱۰۰ ولادتونو کې رسیږی پدې سندروم کې **Mental Retardation** قلبی انومالي او د منځ، لاسونو او پښو تبارز واضح لیدل کېږي.

**-b Trisomy 17-18**: پدې انومالي کې **Mental Retardation** قلبی انومالي، د غوږونو ښکته والی د اصلي محل نه او د لاسونو د قبض حالت لیدل کېږي، پدې انومالي کې د گوتو وصالوآلې او د کلیې سؤ تشکلات هم لیدل کېدای شي. دا انومالي په ۱۰۰۰۰ ولادتونو کې دری واقعی لیدل کېږي او اکثر ماشومان د دوه میاشتو په عمر کې خپل ژوند د لاسه ورکوي.

**-c Trisomy 13-15**: پدې انومالي کې **Mental**



Patau's syndrome (Trisomy 13-15)


**Retardation** قلبی  
**Cleft Lip**, انومالي  
**Congenital Deafness**,  
**Microphtalmy**,  
**Cleft palate** او  
 داسې نور سؤ  
 تشکلات لیدل کېږي.

دا انومالي په هرو ۱۰۰۰۰ ولادتونو کې دوې واقعې لیدل کېږي او اکثر ماشومان د دريو مياشتو نه مخکې مري.

## **B - د Sex chromosome يا جنسي کروموزومونو**

انومالي: په جنسي کروموزومونو کې هم Trisomy او Monosomy لیدل کېږي چه مهم ترين انومالی په لاندې ډول دی.

### **a - *klin Felters Syndrome*** دا انومالي په نارينه کې



**Klin Felters Syndrome:**

لیدل کېږي چه د هغه اعراض او علايم عبارت د infertility يا عقامت، د خصيې Atrophy د منوي قناتونو ډکېدل د منضم نسج پواسطه او Gynicomastia څخه دی، پدې انومالي کې ۴۷

کروموزومونه وجود لري يعنې يو X جنسي کروموزوم اضافی لیدل کېږي XXY دا انومالي په هر ۵۰۰ ولادتونو کې يوې واقعې ته رسيږي.

**-b Turner's Syndrome:** دا انومالي په مؤنث جنس کې لیدل کېږي چه د هغه اعراض او علايم عبارت د تحيض نه



Turner's Syndrome

موجودیت یا  
Amenorrhea د

تخمندان او جنسي  
اعضاؤ عدم نشونماً د  
اطرافو سو تشکل او

Mental  
Retardation څخه

دی پدې نوع انومالی  
کې Chromatin

Sex منفی او د

کروموزومونو تعداد ۴۵ دی، یعنی یو X کروموزوم کم وی (XO) ، دا انومالي په هرو ۳۰۰۰ ولادتونو کې دوی واقعی لیدل کېږي.

**-c Triple x Syndrome:** دا سندروم د یوې XX تخمې د القاح څخه د X سپرماتوزوا پواسطه منځته راځي، پدې انومالي کې تحيض پراگنده یا Scanty Menses او د Mental Retardation مختلفې درجې لیدل کېږي همدارنگه په حجراتو کې دوه جنسي کروماتین وجود لري. نوځکه بعضې اوقات د Super Female په نوم هم یادېږي.

## 2- Structural Abnormality یا ساختمانی انومالی

بعضی اوقات د یوه کروموزوم د ماتیدو یا پارچه کېدو په اثر هم یو تعداد انومالی منځته راځي چه دا پارچه کېدل یا



Cry of cat Syndrome


ماتیدل اکثراً د محیطی عواملو لکه یو تعداد ویروسي امراض او Radation بعضی داروگانو په اثر صورت نیسي مهم

ترین سندروم چه ددې نوع انومالی پواسطه منځته راځي عبارت د Cry of cat Syndrome او Prader Willi Syndrom څخه دی چه د اولی انومالی اعراض او علایم عبارت د پشو غوندی آواز، Microcephaly، قلبی انومالی او Mental Retardtion څخه دي. د دوهمی انومالی اعراض او علایم عبارت د Obesity، Hypotonia، Mental- Cryptorchidism، Hypogonadism او Retardation څخه دی.


### 3- Genetic Anomalies یا جنیتیکي انومالی

د ولادی سؤ تشکلاتو ۱۰ فیصده جنیتیکي انومالی تشکیلوي چه ارثی دی او د یوه یا خو Gens د Mutation په اثر منخته راځي.

په خلاصه توګه ویلای شو چه د پورتنیو فکتورو په مقابل کې رشیم د حمل په اولو دریو میاشتو کې فوق العاده حساس وی مثلاً په اولو دوه هفتو کې پورتنی فکتورونه اکثراً د رشیم د مرګ سبب او د دریمی څخه تر اتمی هفتې پورې د کبیره سؤ تشکلاتو لکه قلبی، علوی او سفلي اطرافو او شونډو د انومالیو سبب ګرځي. همدارنګه د نهمې هفتې څخه تر دولسمې هفتې پورې CNS، غوړونه، سترګې، غابښونه، حنک یا تالو او خارجي تناسلي اعضا د پورتنیو فکتورونو په مقابل کې زیات حساس دی او اکثراً ددې اعضاوو د وظیفوی اوصغیره سؤ تشکلاتو سبب ګرځي. د دولسمې هفتې څخه بیا د حمل تر آخره پورې ولادی سؤ تشکلات ډیر کم لیدل کېږي او پدې دوران کې تر ټولو حساس سیستم د پورتنیو فکتورونو په مقابل کې مرکزی عصبي سیستم دی.



دولادی انومالیود وقوع احتمال دزیر دون څخه دمخه





EMBRYONIC DEVELOPMENT IN DAYS			
<b>Day 1 Fertilization</b> 	<b>Day 2 Two-cell stage</b> 	<b>Day 3 Morula</b> 	<b>Day 4 Early blastocyst</b> 
<b>Day 8 Fertilization</b> 	<b>Day 9 Trophoblast with lacunae</b> 	<b>Day 10-11 Embryo in uterus 10-11 days after ovulation</b> 	
<b>Day 15 Laterality established</b> 	<b>Day 16 Gastrulation: Formation of germ layers</b> 	<b>Day 17 Epiblast forms germ layers</b> 	<b>Day 18 Trilaminar embryonic disc</b> 
<b>Day 22 Neural tube closure begins</b> 	<b>Day 23 Neural tube zippers</b> 	<b>Day 24-25 Villus formation continues in the placenta</b> 	
<b>Day 29 Arm and leg buds</b> 	<b>Day 30 Developing face</b> 	<b>Day 31 Gut development</b> 	<b>Day 32 Embryo in chorionic cavity</b> 
<b>Day 36 Physiological umbilical hernia</b> 	<b>Day 37 Developing face</b> 	<b>Day 38 Muscle development</b> 	<b>Day 39 Endodermal derivatives</b> 
<b>Day 43 Limb cartilages and digital rays</b> 	<b>Day 44 Developing face</b> 	<b>Day 45 Conotruncal and ventricular septa</b> 	<b>Day 46</b> 

د شیمی انکشاف د هری ورخی په نظر کی نیولو سره

EMBRYONIC DEVELOPMENT IN DAYS																									
<p><b>Day 5 Late blastocyst</b></p>	<p><b>Day 6-7 Events during first week: Fertilization to implantation</b></p>	<p><b>Development Week 1</b></p>																							
<p><b>Day 12 Fertilization</b></p>	<p><b>Day 13 Uteroplacental circulation begins</b></p>	<p><b>Day 14 Embryonic disc: dorsal view</b></p>	<p><b>Development Week 2</b></p>																						
<p><b>Day 19 CNS induction</b></p>	<p><b>Day 20 Neurulation: Neural folds elevate</b></p>	<p><b>Day 21 Transverse section through somite region</b></p>	<p><b>Development Week 3</b></p>																						
<p><b>Day 26 Pharyngeal arches present</b></p>	<p><b>Day 27</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Approx. Age (Days)</th> <th>No. of Somites</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>1-4</td></tr> <tr><td>21</td><td>4-7</td></tr> <tr><td>22</td><td>7-10</td></tr> <tr><td>23</td><td>10-13</td></tr> <tr><td>24</td><td>13-17</td></tr> <tr><td>25</td><td>17-20</td></tr> <tr><td>26</td><td>20-23</td></tr> <tr><td>27</td><td>23-26</td></tr> <tr><td>28</td><td>26-29</td></tr> <tr><td>30</td><td>34-35</td></tr> </tbody> </table>	Approx. Age (Days)	No. of Somites	20	1-4	21	4-7	22	7-10	23	10-13	24	13-17	25	17-20	26	20-23	27	23-26	28	26-29	30	34-35	<p><b>Day 28 Neurulation complete</b></p>	<p><b>Development Week 4</b></p>
Approx. Age (Days)	No. of Somites																								
20	1-4																								
21	4-7																								
22	7-10																								
23	10-13																								
24	13-17																								
25	17-20																								
26	20-23																								
27	23-26																								
28	26-29																								
30	34-35																								
<p><b>Day 33 Umbilical ring</b></p>	<p><b>Day 34 Optic cup and lens placode</b></p>	<p><b>Day 35 Branchial arches and clefts</b></p>	<p><b>Development Week 5</b></p>																						
<p><b>Day 40 Auricular hillocks</b></p>	<p><b>Day 41 Atrial septum formed</b></p>	<p><b>Day 42 Digit formation</b></p>	<p><b>Development Week 6</b></p>																						
<p><b>Day 47 External genitalia</b></p>	<p><b>Day 48 Facial prominences fused</b></p>	<p><b>Day 49 Digits present, eyelids forming</b></p>	<p><b>Development Week 7</b></p>																						

---21QQ21Q---

د شیمی انکشاف د هری ورخی په نظر کی نیولو سره

Book Name	General Embryology
Author	Prof. Dr. Baray Seddiqi
Assistant	Dr. Samiullah Safi
Publisher	Khost Medical Faculty
Website	<a href="http://www.szu.edu.af">www.szu.edu.af</a>
Number	1000
Published	2012
Download	<a href="http://www.ecampus-afghanistan.org">www.ecampus-afghanistan.org</a>

This Publication was financed by the German Academic Exchange Service (**DAAD**) with funds from the German Federal Foreign Office.

Administrative and Technical support by **Afghanic** organization.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it.

Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your text books please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul

Office: 0756014640

Email: [textbooks@afghanic.org](mailto:textbooks@afghanic.org)

All rights are reserved with the author.

ISBN: 9789936200128

## Message from the Ministry of Higher Education



In the history, book has played a very important role in gaining knowledge and science and it is the fundamental unit of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers of Higher Education Institutions and I am very thankful to them who have worked for many years and have written or translated textbooks.

I also warmly welcome more lecturers to prepare textbooks in their respective fields. So, that they should be published and distributed among the students to take full advantage of them.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and updated learning materials in order to better educate our students.

At the end, I am very grateful to the German Federal Foreign Office, the German Academic Exchange Service (DAAD) and all those institutions and people who have provided opportunities for publishing medical textbooks.

I am hopeful that this project should be continued and publish textbooks in other subjects too.

Sincerely,

Prof. Dr. Obaidullah Obaid  
Minister of Higher Education  
Kabul, 2012

## **Publishing of textbooks & support of medical colleges in Afghanistan**

Honorable lecturers and dear students,

The lack of quality text books in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging the students and teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. In the past two years we have successfully published and delivered copies of 60 different books to the medical colleges across the country.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

*“Funds will be made ensured to encourage the writing and publication of text books in Dari and Pashto, especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of- the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this, it would not be possible for university students and faculty to acquire updated and accurate knowledge”*

The medical colleges' students and lecturers in Afghanistan are facing multiple challenges. The out-dated method of lecture and no accessibility to update and new teaching materials are main problems. The students use low quality and cheap study materials (copied notes & papers), hence the Afghan students are deprived of modern knowledge and developments in their respective subjects. It is vital to compose and print the books that have been written by lecturers. Taking the critical situation of this war torn country into consideration, we need desperately capable and professional medical experts. Those, who can contribute in improving standard of medical education and public health throughout Afghanistan, thus enough attention, should be given to the medical colleges.

For this reason, we have published 60 different medical textbooks from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh & Kabul medical colleges. Currently we are working on to publish 60 more different medical textbooks, a sample of which is in your hand. It is to mention that all these books have been distributed among the medical colleges of the country free of cost.

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan universities, lecturers & students they want to extend this project to non-medical subjects like (Science, Engineering, Agriculture, Economics & Literature) and it is reminded that we publish textbooks for different colleges of the country who are in need.

As stated that publishing medical textbooks is part of our program, we would like to focus on some other activities as following:

### **1. Publishing Medical Textbooks**

This book in your hand is a sample of printed textbook. We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of Higher Education Institutions, there is need to publish about 100 different textbooks each year.

### **2. Interactive and Multimedia Teaching**

In the beginning of 2010, we were able to allocate multimedia projectors in the medical colleges of Balkh, Herat, Nangarhar, Khost & Kandahar. To improve learning environment the classrooms, conference rooms & laboratories should also be equipped with multimedia projectors.

### **3. Situational Analysis and Needs Assessment**

A comprehensive need assessment and situation analysis is needed of the colleges to find out and evaluate the problems and future challenges. This would facilitate making a better academic environment and it would be a useful guide for administration and other developing projects.

#### **4.College Libraries**

New updated and standard textbooks in English language, journals and related materials for all important subjects based on international standards should be made available in the libraries of the colleges.

#### **5.Laboratories**

Each medical college should have well-equipped, well managed and fully functional laboratories for different fields.

#### **6.Teaching Hospitals (University Hospitals)**

Each medical college should have its own teaching hospital (University Hospital) or opportunities should be provided for medical students in other hospitals for practical sessions.

#### **7.Strategic Plan**

It would be very nice if each medical college has its own strategic plan according to the strategic plan of their related universities.

**I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We assure them quality composition, printing and free of cost distribution to the medical colleges.**

**I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.**

We are very thankful to the German Federal Foreign Office & German Academic Exchange Service (DAAD) for providing funds for 90 different medical textbooks and the printing process for 50 of them are ongoing. I am also thankful to Dr. Salmaj Tural from J. Gutenberg University Mainz/Germany, Dieter Hampel member of Afghanic/Germany and Afghanic organization for their support in administrative & technical affairs.



I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the past two years in Afghanistan.

In Afghanistan, I would like cordially to thank His Excellency the Minister of Higher Education, Prof. Dr. Obaidullah Obaid, Academic Deputy Minister Prof. Mohammad Osman Babury and Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Associate Prof. Dr. Gul Hassan Walizai, the universities' chancellors and deans of the medical colleges for their cooperation and support for this project. I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and gave all these books to be published.

At the end I appreciate the efforts of my colleagues Dr. M. Yousuf Mubarak, Abdul Munir Rahmanzai, Ahmad Fahim Habibi, Subhanullah and Hematullah in publishing books.

Dr Yahya Wardak

CIM-Expert at the Ministry of Higher Education, November, 2012

Karte 4, Kabul, Afghanistan

Office: 0756014640

Email: [textbooks@afghanic.org](mailto:textbooks@afghanic.org)

[wardak@afghanic.org](mailto:wardak@afghanic.org)



## **Abstract**

This book is written by prof.Dr. Baray Seddiqui under the title of Embryology. The book is very important for the medical students. Embryology is a basic subject in medicine and explains the prenatal and postnatal period and development of gametes. Students will also know how to take care of pregnant women.

Embryology is a prerequisite subject of Pediatric Surgery and Gynecology. It is written under the curriculum of Kabul Medical University and we collected the update and fresh materials, illustrated images and diagram for best knowing of the students.

Thanks

**Prof .Dr Baray Seddiqui**

*Faculty member and Lecturere of Histology Department*

*Department of Histology*

- د اوليه صحى مراقبتونو په ورکشاپ کې گډون (د نړيوال روغتيايي سازمان لخوا ۱۹۸۷م)

- د تعليمي پلان د ارزيايي ورکشاپ دنړيوال روغتيايي سازمان لخوا ۱۹۸۷م

- د تعليمي اهدافو ورکشاپ د نړيوال روغتيايي سازمان لخوا ۱۹۸۷م

- د نړۍ په مختلفو هيوادونو کې په بيلا بيلو ورکشاپونو، سمینارونو او کنفرانسونو کې گډون.

پاتې دې نه وې چې نوموړي خو، خو ځله د نوبتگر استاد په توگه د هيواد د دنني او بهرني پوهنتونونو او اړوندو ادارو له خوا ستاينليکونه ترلاسه کړي دي .

- د کابل طبي پوهنتون په علمي شورا کې ګډون.
- د کابل طبي پوهنتون د نوي او معاصر کوریکولم په کمیټه کې ګډون.
- د لوړو زده کړو وزارت د کوریکولم او کريډیټ سیستم په کمیټه کې ګډون.
- د لوړو زده کړو وزارت په عالی شورا کې ګډون.
- د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسساتو د رهبرۍ په کمیټه کې ګډون.
- د ظرفیت د لوړوالي ترینګونو کې د هیواد په داخل او بهر کې ګډون.
- د طبي تعلیماتو ترینګ د جاپان په توکیو پوهنتون کې (۲۰۰۵م).
- د درسي میتودونو ترینګ د امریکا په نبرسکا پوهنتون کې (۲۰۰۵م).
- د طبي تعلیماتو ترینګ د مالیزیا د کولالمپور په پوهنتون کې (۲۰۰۷م).
- د ۲۰۰۷م کابل په دسمبر کې د پاکستان لاهور ښار د King Edward د پوهنتون څخه لیدنه.
- د عالی تعلیماتو د ادارې په هکله ترینګ (د تایلند په ینکاک کې ۲۰۰۹م).
- د حرفی او مسلکي کالجونو په سمپوزیم کې ګډون (د اردن په عمان ښار کې).
- د انګلیسي او ادارې په اړه دري میاشتي کورس کې ګډون (کابل کې ادارې اصلاحاتو د مستقل ریاست لخوا ۲۰۰۷م)

په ۱۳۸۱ هجري شمسي کال کې خپل هیواد ته راستون او د بیا لپاره د کابل طبي پوهنتون هستولوژی او امبریولوژی په دیپارټمنټ کې په خپله وظیفه بوخت شو.

په لنډه توګه بیلابیلو اکاډمیک پوستونو کې د (پوهاند بري) تر سره شوو دندو او چوپړتیاوو ته یوه کتنه:

- ۱۳۶۰ هـ.ش کال څخه را پدېخوا د کابل طبي پوهنتون د هستولوژی او امبریولوژي په څانګه کې د استاد په توګه.
- ۱۳۶۵ هـ.ش کال نه تر ۱۳۷۰ هـ.ش کال پوری د طب د انستیتوت د تدریساتو عمومي مدیر.
- ۱۳۷۲ هـ.ش کال نه تر ۱۳۷۷ هـ.ش کال پوری د ابدالی پوهنتون طب پوهنځی د رئیس په توګه.
- ۱۳۷۷ هـ.ش کال نه تر ۱۳۸۱ هـ.ش کال پوری په افغان پوهنتون کی د استاد په توګه.
- ۱۳۸۵ هـ.ش کال نه تر ۱۳۸۸ هـ.ش کال پوری کابل د طبي پوهنتون د محصلینو د چارو د مرستیال په توګه.
- ۱۳۸۸ هـ.ش کال نه تر ۱۳۹۰ هـ.ش کال پوری د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو دریس په توګه.
- او ۱۳۹۰ هـ.ش کال نه را پدېخوا د لوړو زده کړو د محصلانو د چارو معین په توګه.

په مختلفو شوراګانو، کمیټو او علمي سیمینارونو او ورکشاپونو کی د نوموړي

ګډون:



## د پوهاند دوکتور بري صديقي لنجه پيژندنه

پوهاند دوکتور بری صديقي د اختر محمد صديقي زوی چې په ۱۳۳۴ هجري شمسي کال د قندهار په يوه تاريخي او وياړلي ولايت کې په يوه متدينه، علمي او روشنفکره کورنۍ کې زېږېدلی دی.

بری صديقي په ۱۳۵۳ هجري شمسي کال کې د قندهار ولايت د احمد شاه بابا عالي لیسې څخه په اعلي درجه فارغ او وروسته د کابل طب پوهنځي ته شامل شو، په ۱۳۶۰ هجري شمسي کال کې د طب پوهنځي د معالجوي څانگې څخه د MD په درجه فارغ شو، په همدغه کال د کابل طب انستیتیوت د هستیولوژی او امبریولوژی په ډیپارټمنټ کې د استاد په توگه په ډیر افتخار سره ومنل شو، نوموړي په دغه ډیپارټمنټ کې په ډیر اخلاص او صداقت سره خپلې سپیڅلې دندې ته تر ۱۳۷۰ هجري شمسي پورې ادامه ورکړه او د گران هیواد زرگونه بچیان یې د روغتیايي چوپړتیا په موخه وروزل وروسته بیا د هیواد اجتماعي او امنیتي ستونزو له امله و د پاکستان هیواد ته په هجرت کولو مجبور شو، نوموړي د مقدس احساس او سپیڅلي جذبې په درلودلو سره د هجرت په دوره کې هم خپلې دندې ته ادامه ورکړه او په بیلابیلو افغاني پوهنتونونو کې یې تدریسي او نور بنسټیز بنسټیز او روزنیز خدمتونه په ډیر بریالیتوب او ورین تندي سره تر سره کړل او هلته یې هم د هیواد بچیان د طبابت په ډگر کې وروزل.